

品目 種有り 巨峰・高妻・安芸クイン・クインナ・リザマート・黄玉

認証区分 エコ100・**エコ50**

水稲においては品種も記載すること

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|-------|----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|--------------|---------|----------|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | | | | | | | 窒素(N)量 全体 | 内化学肥料由来 | |
| 市・町 | 10 7 16 20 4.3 2.6 | 土作り | 10月28~12月6日 | (育苗等) | 使用する資材はすべて記載すること。 | | | | | | (苗・種子)※ | | | | |
| | | 剪定・誘引 | 12月20~2月25日 | | | | | | | | | | | | |
| | | トンネル被覆 | 4月7~4月17日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 芽かき・誘引 | 4月20~8月20日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 摘穂 | 5月20~6月10日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 摘房 | 6月15~7月20日 | (ほ場) | | | | | | | | | | | |
| | | 摘粒 | 6月20~7月3日 | アタック1K | - | 0.1 | - | | | H29.5.2 | モスピラン水溶剤(アセチミプリド) | 殺虫 | 1 | H29.5.2 | |
| | | 袋掛け | 7月2~7月9日 | トクゲン1号 | - | 0.2 | - | | | H29.5.2 | ジマンダイセン水和剤(マンゼブ) | 殺菌 | 1 | H29.5.7 | |
| | | 被覆取外し | 7月14~7月18日 | バ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | | | H29.5.2 | アブローチBI | ホ リオキエチレンヘキサン脂 | 展着剤 | - | H29.5.20 |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | | | H29.5.7 | アフェットフロアブル | ベンチオピラト [(RS)] | 殺菌 | 1 | H29.5.20 |
| | | | | トクゲン1号 | - | 0.2 | - | | | H29.5.7 | フラスター液剤 | メビコトクロリド | 着粒安定 | 1 | H29.5.20 |
| | | | | バ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | | | H29.5.7 | アルバリン顆粒水溶剤 | ジノテフラン | 殺虫 | 1 | H29.5.24 |
| | | | | アリンサンデ SN無し | 0-33-8 | 0.2 | | 0.0 | | H29.5.20 | ピラニカ水和剤 | デブフェントピラト | 殺虫 | 1 | H29.6.4 |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | | | H29.5.20 | オソサイド水和剤 | 8 キャブタン | 殺菌 | 1 | H29.6.4 |
| | | | | トクゲン1号 | - | 0.2 | - | | | H29.5.20 | オンリーワンフロアブル(管) | デブコザール | 殺菌 | 1 | H29.6.16 |
| | | | | バ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | | | H29.5.20 | アデントフロアブル | アクリナトリン | 殺虫 | 1 | H29.7.6 |
| | | | | アニマルエース | 6-8-4 | 19.0 | 11.4 | 0.2 | | H29.5.23 | アミスター1070フロアブル | アジキリストピリン | 殺菌 | 1 | H29.7.6 |
| | | | | アリンサンデ SN無し | 0-33-8 | 0.2 | | 0.0 | | H29.5.24 | ICボルト-66D | 銅水和剤(塩基性) | 殺菌 | - | 7月中旬 |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | | | H29.5.24 | アピオンE | バラフィン | 展着剤 | - | 7月中旬 |
| | | | | トクゲン1号 | - | 0.2 | - | | | H29.5.24 | アピオンE | バラフィン | 展着剤 | - | 8月上旬 |
| | | アタック1K | - | 0.1 | - | | | H29.6.4 | ICボルト-66D | 銅水和剤(塩基性) | 殺菌 | - | 8月上旬 | | |
| | | トクゲン1号 | - | 0.2 | - | | | H29.6.4 | アピオンE | バラフィン | 展着剤 | - | 8月上旬 | | |
| | | アリンサンデ S2号 | 4-33-8 | 0.2 | | 0.0 | | H29.6.18 | | | | | | | |
| | | アタック1K | - | 0.1 | - | | | H29.6.18 | | | | | | | |
| | | バ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | | | H29.6.18 | | | | | | | |
| | | バ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | | | | | | | | | | |
| | | 加りん糖 | 0-1.5-0.5 | 0.2 | | 0.0 | | | | | | | | | |
| | | トクゲン3号 | - | 0.2 | - | | | | | | | | | | |
| | | ファーマン1Kg | - | 0.2 | - | | | | | | | | | | |
| | | 加りん糖 | 0-1.5-0.5 | 0.2 | | 0.0 | | | | | | | | | |
| | | トクゲン3号 | - | 0.2 | - | | | | | | | | | | |
| | | ファーマン1Kg | - | 0.2 | - | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | 出荷量計画 | 計 | | | 11.4 kg/10a | 0.2 kg/10a | 削減率 | 計 | | 10 回 | 削減率 | | | | |
| 1,200 kg/10a | 1200 kg/10a | 山口県基準 | | | | 16.0 kg/10a | 98.5% | 山口県基準 | | 31 回 | 67.7% | | | | |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

| | |
|----|--------|
| 品目 | 種有り 高墨 |
|----|--------|

| | |
|------|---------------------|
| 認証区分 | エコ100 ・ <u>エコ50</u> |
|------|---------------------|

水稻においては品種も記載すること

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------|-------------------|---------|---------------|------------|--|--|--|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 全体 内化学肥料由来 | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | |
| 市・町 | 1 4 2 15 3 4 | 土作り 剪定・誘引 ハウス被覆 芽かき・誘引 摘穂 摘粒 袋掛け | 10月28~12月6日 12月20~2月25日 2月25~3月10日 4月2~8月1日 5月8~5月15日 5月28~6月15日 6月20~7月1日 | (育苗等) | | | | | | | (苗・種子)※ | | | | | |
| | | | | (ほ場) | | | | | | | (ほ場) | | | | | |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29. 4. 18 | モスビラン水溶剤 (アセチムリト) | 殺虫 | 1 | H29. 4. 18 | | | |
| | | | | ファーマン1Kg | - | 0.2 | - | - | H29. 4. 18 | ジマンタイオン水和剤 | 殺菌 | 1 | H29. 4. 25 | | | |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29. 4. 25 | アフェットフロアブル | 殺菌 | 1 | H29. 5. 2 | | | |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29. 4. 25 | フラスター液剤 | 着粒安定 | 1 | H29. 5. 3 | | | |
| | | | | バ イオスフ リンク 1Kg | - | 0.1 | - | - | H29. 4. 25 | アルパリン顆粒水溶剤 | 殺虫 | 1 | H29. 5. 7 | | | |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29. 5. 2 | ピラニカ水和剤 | 殺虫 | 1 | H29. 5. 24 | | | |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29. 5. 2 | オンサイト 水和剤 | 殺菌 | 1 | H29. 5. 24 | | | |
| | | | | アリンサンデスN無し | 0-33-8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | H29. 5. 2 | オンリーワンフロアブル(普通) | 殺菌 | 1 | H29. 6. 18 | | | |
| | | | | バ イオスフ リンク 1Kg | - | 0.1 | - | - | H29. 5. 2 | アデントフロアブル | 殺虫 | 1 | H29. 6. 18 | | | |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29. 5. 7 | アピオンE | 展着剤 | - | 7月下旬 | | | |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29. 5. 7 | アピオンE | 展着剤 | - | 8月上旬 | | | |
| | | | | アリンサンデスN無し | 0-33-8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | H29. 5. 7 | バ ラフィン | | | | | | |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29. 5. 24 | | | | | | | |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29. 5. 24 | | | | | | | |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29. 6. 18 | | | | | | | |
| | | | | アリンサンデス2号 | 4-33-8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | H29. 6. 18 | | | | | | | |
| | | | | バ イオスフ リンク 1Kg | - | 0.1 | - | - | H29. 6. 18 | | | | | | | |
| | | | | 加りん糖 | 0-1.5-0.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 7月下旬 | | | | | | | |
| | | | | トウゲン3号 | - | 0.23 | - | - | 7月下旬 | | | | | | | |
| | | | | ファーマン1Kg | - | 0.23 | - | - | 7月下旬 | | | | | | | |
| | | | | 加りん糖 | - | 0.23 | - | - | 8月上旬 | | | | | | | |
| | | | | トウゲン3号 | 0-1.5-0.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8月上旬 | | | | | | | |
| | | | | ファーマン1Kg | - | 0.23 | - | - | 8月上旬 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | | 出荷量計画 | | 計 | | | 0.0 kg/10a | 0.0 kg/10a | 削減率 | | | 9 回 | 削減率 | | | |
| 1,200 kg/10a | | 1200 kg/10a | | 山口県基準 | | | | 16.0 kg/10a | 99.8% | | | 31 回 | 71.0% | | | |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

| | |
|----|-------------------------------------|
| 品目 | 種無し 瀬戸ジャイアント・シャインマスカット・マスカットピオレ・昭平紅 |
|----|-------------------------------------|

| | |
|------|--------------------|
| 認証区分 | エコ100・ <u>エコ50</u> |
|------|--------------------|

水稲においては品種も記載すること。

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|---------|-----------|--------------------|-----------------|------|---------------|----------|
| | | 作業名 | 時期 | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 |
| | | | | | | | 全体 | 内化学肥料由来 | | | | | | |
| 市・町 | 4 15 4 | 土作り | 10月28~12月6日 | | | | | | | | | | | |
| | | 剪定・誘引 | 12月20~2月25日 | (育苗等) | | | | | | | | | | |
| | | ハウス被覆 | 2月25~3月10日 | | | | | | | | | | | |
| | | 芽かき・誘引 | 4月2~8月1日 | | | | | | | | | | | |
| | | 摘穂 | 5月8~5月15日 | | | | | | | | | | | |
| | | 摘粒 | 5月28~6月15日 | (ほ場) | | | | | | | | | | |
| | | 袋掛け | 6月20~7月1日 | | | | | | | | | | | |
| | | | | アミノエース | 6-8-4 | 15.71 | 9.4 | 0.2 | H28.12.17 | シナミト | シナミト | 萌芽促進 | 1 | H29.2.28 |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29.4.18 | モスピラン水溶剤 (アセチミプリド) | アセチミプリド | 殺虫 | 1 | H29.4.18 |
| | | | | ファーマン1Kg | - | 0.2 | - | - | H29.4.18 | シマンガイオン水和剤 | マンゼブ水和剤75% | 殺菌 | 1 | H29.4.25 |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29.4.25 | アグレット液剤 | ストロプトマイシン | 種無子化 | 1 | H29.5.3 |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29.4.25 | アルパリン顆粒水溶剤 | シノフラン水溶剤20% | 殺虫 | 1 | H29.5.7 |
| | | | | バイオスプリング1Kg | - | 0.1 | - | - | H29.4.25 | ジベレリン水溶剤 | ジベレリン50mg(3.1%) | 種無子化 | 1 | H29.5.10 |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29.5.2 | フルメット液剤 | ホルクロフェニロン0.10% | 果粒肥大 | 1 | H29.5.10 |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29.5.2 | ジベレリン水溶剤 | ジベレリン50mg(3.1%) | 種無子化 | 1 | H29.5.19 |
| | | | | アリンサンデスN無し | 0-33-8 | 0.23 | - | 0.0 | H29.5.2 | ピラニカ水和剤 | デブフェントピラト | 殺虫 | 1 | H29.5.24 |
| | | | | バイオスプリング1Kg | - | 0.1 | - | - | H29.5.2 | オンザイト水和剤 | キャプタン | 殺菌 | 1 | H29.5.24 |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29.5.7 | オンリーワンフロアブル(普通) | デブコザール | 殺菌 | 1 | H29.6.18 |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29.5.7 | アデントフロアブル | アクリナリン | 殺虫 | 1 | H29.6.18 |
| | | | | アリンサンデスN無し | 0-33-8 | 0.23 | - | 0.0 | H29.5.7 | アビオンE | バラフィン | 展着剤 | - | 7月下旬 |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29.5.24 | アビオンE | バラフィン | 展着剤 | - | 8月上旬 |
| | | | | トウゲン1号 | - | 0.23 | - | - | H29.5.24 | | | | | |
| | | | | アタック1K | - | 0.1 | - | - | H29.6.18 | | | | | |
| | | アリンサンデス2号 | 4-33-8 | 0.23 | - | 0.0 | H29.6.18 | | | | | | | |
| | | バイオスプリング1Kg | - | 0.1 | - | - | H29.6.18 | | | | | | | |
| | | 加りん糖 | 0-1.5-0.5 | 0.23 | - | 0.0 | H29.6.18 | | | | | | | |
| | | トウゲン3号 | - | 0.23 | - | - | | | | | | | | |
| | | ファーマン1Kg | - | 0.23 | - | - | | | | | | | | |
| | | 加りん糖 | - | 0.23 | - | - | | | | | | | | |
| | | トウゲン3号 | 0-1.5-0.5 | 0.23 | - | 0.0 | | | | | | | | |
| | | ファーマン1Kg | - | 0.23 | - | - | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | 出荷量計画 | 計 | | | | 9.5 kg/10a | 0.2 kg/10a | 削減率 | 計 | | | 12 回 | 削減率 | |
| 1,200 kg/10a | 1200 kg/10a | 山口県基準 | | | | | 16.0 kg/10a | 98.8% | 山口県基準 | | | 31 回 | 61.3% | |

使用する資材はすべて記載すること。

(苗・種子) ※

(ほ場)

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること

エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

| | |
|----|-------------------------------|
| 品目 | 種無し ピオネ・伊豆錦・高妻・シノスマイル・翠峰・コルビー |
|----|-------------------------------|

| | |
|------|--------------------|
| 認証区分 | エコ100・ エコ50 |
|------|--------------------|

水稲においては品種も記載すること

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|---------|-----------|-------------------|--------------------|------|---------------|----------|
| | | 作業名 | 時期 | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 |
| | | | | | | | 全体 | 内化学肥料由来 | | | | | | |
| | | 土作り | 10月28~12月6日 | | | | | | | | | | | |
| | | 剪定・誘引 | 12月20~2月25日 | (育苗等) | | | | | | | | | | |
| | | トンネル被覆 | 4月7~4月17日 | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 芽かき・誘引 | 4月20~8月20日 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 摘穂 | 5月20~6月10日 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 摘房 | 6月15~7月20日 | (ほ場) | | | | | | | | | | |
| | | 摘粒 | 6月20~7月3日 | アノムエース | 6-8-4 | 15.32 | 9.2 | 0.2 | H28.12.17 | モスピラン水溶剤 (アセチムリト) | 殺虫 | 1 | H29.5.2 | |
| | | 袋掛け | 7月2~7月9日 | トウケン1号 | - | 0.23 | - | - | 4月下旬 | ジマンダ イオン水和剤 マンゼブ | 殺菌 | 1 | H29.5.7 | |
| | | 被覆取外し | 7月14~7月18日 | ハ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | - | 4月下旬 | アフェットプロアブル | ハ ンチビ ラト [(RS) 殺菌 | 1 | H29.5.20 | |
| | | | | アタック 1 K | - | 0.1 | - | - | 5月上旬 | フラスター液剤 | ビ ュート クロリト | 着粒安定 | 1 | H29.5.20 |
| | | | | トウケン1号 | - | 0.23 | - | - | 5月上旬 | アブ ローチBI | ホ リオキエチルヘキサン | 展着剤 | - | H29.5.20 |
| | | | | ハ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | - | 5月上旬 | アムバ リン 顆粒水溶剤 | ジ ノテフ | 殺虫 | 1 | H29.5.24 |
| | | | | アタック 1 K | - | 0.1 | - | - | 5月中旬 | フルメット液剤 | ホルコフェニ ホルクロ | 果粒肥大 | 1 | H29.5.25 |
| | | | | トウケン1号 | - | 0.23 | - | - | 5月中旬 | ジ ベ リン 水溶剤 | ジ ベ リン ジ ベ リン 50 | 種無し化 | 1 | H29.5.25 |
| | | | | ハ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | - | 5月中旬 | ビ ラニカ水和剤 | デ プ フェント ビ ラト | 殺虫 | 1 | H29.6.4 |
| | | | | アリンサンデ スN無し | 0-33-8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5月中旬 | オーソサイド 水和剤 | キ ャブ タン | 殺菌 | 1 | H29.6.4 |
| | | | | トウケン1号 | - | 0.23 | - | - | 5月下旬 | ジ ベ リン 水溶剤 | ジ ベ リン ジ ベ リン 50 | 種無し化 | 1 | H29.6.10 |
| | | | | アリンサンデ スN無し | 0-33-8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5月下旬 | オンリーワンプロアブル (善) | デ プ コザール | 殺菌 | 1 | H29.6.16 |
| | | | | アタック 1 K | - | 0.1 | - | - | 6月上旬 | ア ー ト フロアブル | アクリナリン | 殺虫 | - | H29.7.6 |
| | | | | ハ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | - | 6月上旬 | アミスター-10フロアブル | アジ キストロピン | 殺菌 | 1 | H29.7.6 |
| | | | | アリンサンデ ス2号 | 4-33-8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 6月上旬 | ICホ ルト -66D | 銅水和剤 (塩基性) | 殺菌 | - | 7月中旬 |
| | | | | トウケン1号 | - | 0.23 | - | - | 6月上旬 | 7ピ ンE | パ ラフィン | 展着剤 | - | 7月中旬 |
| | | | | アリンサンデ ス2号 | 4-33-8 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 7月上旬 | 7ピ ンE | パ ラフィン | 展着剤 | - | 8月上旬 |
| | | | | 加りん糖 | 0-1.5-0.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 7月下旬 | ICホ ルト -66D | 銅水和剤 (塩基性) | 殺菌 | - | 8月上旬 |
| | | | | トウケン1号 | - | 0.23 | - | - | 7月下旬 | 7ピ ンE | パ ラフィン | 展着剤 | - | 8月上旬 |
| | | | | ハ イオス リンク 1Kg | - | 0.1 | - | - | 7月下旬 | | | | | |
| | | | | 加りん糖 | 0-1.5-0.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 7月下旬 | | | | | |
| | | | | トウケン3号 | - | 0.23 | - | - | 7月下旬 | | | | | |
| | | | | フーマン1Kg | - | 0.23 | - | - | 7月下旬 | | | | | |
| | | | | 加りん糖 | 0-1.5-0.5 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 8月上旬 | | | | | |
| | | | | トウケン3号 | - | 0.23 | - | - | 8月上旬 | | | | | |
| | | | | フーマン1Kg | - | 0.23 | - | - | 8月上旬 | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量計画 | | 出荷量計画 | | 計 | | 9.3 kg/10a | 0.2 kg/10a | 削減率 | 計 | | | 12 回 | 削減率 | |
| 1,200 kg/10a | | 1200 kg/10a | | 山口県基準 | | | 16.0 kg/10a | 98.6% | 山口県基準 | | | 31 回 | 61.3% | |

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬に
 ついて記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式を使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。