BLASTAMによる葉いもち感染好適条件判定結果（R5年度）

○BLASTAM（ブラスタム）とは

アメダスデータ観測地点における気温・降水量・日照時間・風速のデータから葉いもちの感染好適日を判定するシステムです。

○概要

・ ６月第5半旬から7月第3半旬まで県内で好適条件の出現が続いています。

＜対策＞

・ 不要な置き苗は、すみやかに処分する。
・ 移植までにいもち剤を使用していないほ場では、発生がないかほ場をよく観察する。

○BLASTAMによる葉いもち感染好適条件判定結果（2023年7月18日現在）

アメダス	６　月															７　月																	
地　点	16					21					26				30	1					6					11					16		18
須佐	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—
萩	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—
油谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
徳佐	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	△	—	—	—
秋吉台	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
広瀬	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
豊田	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—
山口	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岩国	●	—	—	—	—	—	—	●	？	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—
防府	—	？	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
下松	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	△	—
玖珂	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
下関	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柳井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安下庄	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

出典　一般社団法人　日本植物防疫協会

○上記表の見方

凡例	●：好適条件	△:準好適条件				ー	？
内容	湿潤時間中の平均気温が15～25℃であり、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間を満たし、当日を含めてその日以前5日間の日平均気温の平均値が20℃～25℃の範囲	湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数より短い	湿潤時間は10時間以上であるが、湿潤時間中の平均気温が15℃～25℃の範囲外	湿潤時間は10時間以上であるが、前５日間平均気温が25℃以上	湿潤時間は10時間以上であるが、前５日間平均気温が20℃未満	好適条件なし	判定不能

●印がついている日は、葉いもちの感染好適条件出現した日（感染好適日）を示す。好適条件出現すると5～10日後に発病します。
△印がついている日は、葉いもちに感染するには一部の条件が不足し、やや不適であった日を示します。

○注意事項

感染好適条件が出現したとしても、防除（箱粒剤等）、イネの品種、肥培管理等によって感染、発病しない場合もあります。

感染好適条件が出現しない場合でも、ほ場条件（山際、風通しが悪いなど）で感染に好適な条件となっている可能性があるので、ほ場を十分に見回りましょう。