


# 赤潮注意報

平成30年(2018年)6月4日  
山口県水産振興課

## 漁業者の皆様へ 徳山湾でヘテロシグマ アカシオが 発生しています！

発 生 日	平成30年(2018年)6月4日(月)
発 生 海 域	徳山湾
赤 潮 構 成 種	ヘテロシグマ アカシオ( <i>Heterosigma akashiwo</i> ) (好適水温:20~24℃、好適塩分:22~29psu)
着色海域の色	茶褐色



大きさ:8~25μm×6~15μm

### 調 査 結 果

観測場所	細胞数	備 考
県漁協新南陽市支店前	5,833 個/ml	6月4日 12:15 24.2℃-水深 1.0m
周南市場前	20 個/ml	6月4日 11:32 21.6℃-水深 1.0m

【赤潮注意報:5,000 個/ml 以上、赤潮警報(魚類へい死目安):50,000 個/ml】

### 特 記 事 項

- 本種は、水深の浅い海域では上下動を繰り返し、日中は表層に、夜間は底層に濃密に滞留します。
- 本種は、日中は光合成による過飽和酸素状態に、朝方は増殖・呼吸等による貧酸素状態にさせて、魚類をへい死させる有害プランクトンです。
- 本種赤潮の主な発生時期は、5~7月(梅雨時期)と10月(秋雨時期)です。

### 留 意 事 項

- 今後は、漁港内での蓄養は避けて、活けメ出荷等の対策を講じてください。また、養殖魚等は深い生け簀を活用し、赤潮発生時には代謝を抑えるために餌止めをし、早期出荷などの対策も検討してください。
- 漁船の活け間内のスカッパを閉めて航行するなど、赤潮を含んだ海水が流入しないよう注意してください。
- なお、県は引き続き調査を実施して参りますので、赤潮の発生・魚介類のへい死などが確認された場合は、漁協を通じて関係市・農林水産事務所水産部に速やかに通報してください。
- また、赤潮による漁獲物のへい死等については、漁業被害救済基金の対象となる場合がありますので、漁獲物の処分等を行わず(被害数量等の確認が必要のため)、速やかに漁協を通じて関係市町・農林水産事務所水産部に通報してください。

※県内の赤潮情報については、海鳴りネットワークのホームページでもご覧いただけます。  
→ <http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/suisan-s/akashio.html>

注意報  
【ヘテロシグマ アカシオ】

平成30年6月4日

