

少雨に係る農作物等の技術対策

令和4年6月2日
山口県農林水産部

I 共通事項

1 用水確保

- (1) 水利組合と連携して、適切な計画的配水を徹底する。
- (2) 地下水を利用できる場所は、ボーリングや井戸水を活用する。
- (3) 河川水を利用できる場所は、ポンプ台数や設置場所を検討する。
- (4) 排水の循環利用に努める。

II 各作目の対策

1 水稻

(1) 苗管理

- 用水不足により移植（田植え）が遅れる場合には、剪葉し、箱当たり窒素0.5g程度を追肥する。
- また、著しく移植が遅れる場合、晩植限界時期までに移植できるよう再度の播種・育苗を実施する。早生品種の場合、6月末までの播種は可能である。また、移植の限界期は、平坦地では7月20日頃である。

(2) 本田管理

ア 漏水防止

- 畦畔、水路の点検を行い、畦畔のモグラ穴を補修するなど漏水対策を講じる。
- 畦畔に周囲の青草を刈って敷くことも効果がある。

イ 移植

- 移植時期が著しく遅れた場合は、株あたりの分けつが少なくなるため、穂数確保のために栽植密度を確保する（疎植を避ける）。

ウ 節水栽培

- 計画的配水を行う。
- 節水栽培では、少量の水で速やかにほ場全体に水が行き渡るように、ほ場周囲や中央に作溝を実施する。
- ほ場に著しい亀裂が発生した場合は、降雨や入水直後に軽く中耕し、亀裂を埋めるなどの対応で漏水を防止する。

エ 雑草対策

- 用水不足により、初期～初中期剤による土壌処理効果が不十分なほ場では、雑草の発生状況及び薬剤の使用基準（移植後日数など）に留意し、中後期剤等で対応する。

2 大豆

(1) 播種

- 過乾燥で播種不能な場合は、降雨後に適湿となるまで待って播種する。その場合、栽植密度を高める。

(2) 除草剤散布

- 土壌が乾燥している状態では、土壌処理剤の効果の発揮が困難になるので、多量の希釈水で薬液を調整し、丁寧に散布する。

3 野菜

(1) 播種、定植

- 発芽や活着時には水分要求量が特に高いので、用水の確保を見極めてから、実施する。
- 定植は夕方に行い、可能な限り株元に灌水を行う。

(2) 灌水方法

- 地温が低下している早朝・夕方に実施する。（畝間灌水も同様）
- 果菜類は土壌水分に急激な変化が生じないように、毎日灌水する。

(3) マルチによる乾燥防止

- 敷き草、ワラ、マルチフィルム等によるマルチングを行い、地温上の抑制と土壌水分の蒸発抑制に努める。
- ただし、敷草やワラは白絹病の発生を助長する恐れがあるため、可能な限り株元から離して設置する。

(4) 草勢維持

- 果菜類は不良果を摘果し着果負担の軽減を図るとともに、適切な施肥により樹勢維持に努める。

(5) 害虫防除

- 高温乾燥時には、ハダニ類、アブラムシ類、アザミウマ類などの発生が多くなるので発生に注意し早期に防除する。

4 果樹

(1) 敷草・マルチ

○樹冠下の草は水分の競合を避けるため、刈り取るとともに、敷草・マルチを行い土壌表面からの蒸散を抑制する。

(2) 灌水

○果樹園の蒸発散量は1日当たり3～5mm程度で、晴天が7～10日以上続けば1回に30mm程度の計画的な灌水が必要となることから、灌水施設(ボーリング、ポンプ、スプリンクラー等)の計画的な稼働に努める。

○幼木・根群域の狭い樹種や砂質土壌、南向き傾斜等、干害を受けやすいところでは灌水を開始する。

(3) 害虫防除

○高温乾燥時には、ダニ類(ミカンサビダニ、ミカンハダニ等)、アザミウマ類などの発生が多くなるので発生に注意し早期に防除する。

5 花き

(1) 灌水

○早朝や日没後に畝間灌水を行い、日中は排水する。水量が少ない場合は、日没後の株元灌水を行う。

(2) 蒸散抑制

○露地ギクでは、下葉や不要な側枝を除去し蒸散を抑制する。

(3) マルチによる乾燥防止

○土壌表面からの水分蒸発を防止するため敷ワラ、敷草、マルチフィルム等によるマルチングを行う。

ただし、敷き草やワラは白絹病の発生を助長させる恐れがあるため、可能な限り、株元から離して設置する。

(4) 害虫防除

○高温乾燥時には、ハダニ類、アブラムシ類、アザミウマ類などの発生が多くなるので発生に注意し早期に防除する。

6 飼料作物

(1) 作業

○天候に応じ迅速に作業が行えるよう共同作業等の体制を十分整えておく。

(2) 調製

○気象の変動に応じて乾草からサイレージに切り替える等、臨機応変の対応をとる。その際、サイロが不足するようであれば、ビニールスタックサイロ等簡易なサイロの利用やラップサイレージ調製等を行い、良質飼料の確保に努める。

(3) 草地

○過放牧、過度の低刈りや短い間隔での刈り取りを避け、貯蔵養分の消耗を軽減して草勢の維持に努める。

(4) 青刈りトウモロコシ、ソルガム等

○収穫期が近い場合にはコストに配慮しつつ灌水に努め、灌水が困難ないし回復が困難と見込まれる場合は、早期に収穫を行い品質低下の防止に努める。