





# 除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生													使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに 使用可	備考							
			ノビエ	一年生イネ科雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミスガヤツリ	クロゲワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシウウスズメノヒエ	無人航空機散布	水口施用		灌水周縁散布											
2-27-15	トリアフェモン・フェンキトリオン・フェントラザミド	カウントダウン1キロ粒剤 カウンスルエナジー1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後 30日まで)	○			○	①非SU剤 ②後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。						
2-27-15	トリアフェモン・フェンキトリオン・フェントラザミド	カウントダウンフロアブル カウンスルエナジーフロアブル	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後 30日まで)	○	○		○	①非SU剤 ②後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。						
2-27-15	トリアフェモン・フェンキトリオン・フェントラザミド	カウントダウンジャンボ カウンスルエナジージャンボ	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後 30日まで)	○			○	①非SU剤 ②ノビエ3葉期までの使用を推奨する。 ③後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。						
2-27	トリアフェモン・フェンキトリオン	ブライオリティジャンボ	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	非SU剤						
2-27	トリアフェモン・フェンキトリオン	ブライオリティ豆つぶ250	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後 30日まで)	○	○	○	○	非SU剤						
2-27	トリアフェモン・フェンキトリオン	ブライオリティフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後 30日まで)	○	○		○	非SU剤
2-27	トリアフェモン・フェンキトリオン	ブライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	非SU剤	
27-2	テフリルトリオン・トリアフェモン	カウンスルコンブリー1 キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ 粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後 30日まで)	○			○	①非SU剤 ②後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 ③移植5日後からの使用を推奨する。	
2-2-27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メトリオン	ジャンダルムMX1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草													移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	①非SU剤 ②移植3日後以降の使用を推奨する。						
2-14-27	トリアフェモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン	アシュラフロアブル ゾピシクロン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	①非SU剤 ②早期栽培、砂壌土では葉害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。	
2-14-27	トリアフェモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン	アシュラ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4 葉期(但し、移植後 30日まで)	○			○	①非SU剤 ②後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。	
2-14-27	トリアフェモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン	アシュラジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4 葉期(但し、移植後 30日まで)	○			○	①非SU剤 ②後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 ③早期栽培ではノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。	
15-2-27	フェントラザミド・ペンシルフロンメチル・ベンゾピシクロン	クサトリ―BSXジャンボ L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後1日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	SUR対策剤	
14-27-27	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾピシクロン	イネキングジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後1日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○			○	非SU剤	
15-27-2	フェントラザミド・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロ	天空ジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草													移植後1日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	①SUR対策剤 ②移植3日後以降の使用を推奨する。						
15-27-2	フェントラザミド・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロ	天空エア―粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草													移植後1日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	①SUR対策剤 ②移植3日後以降の使用を推奨する。						
27-27-2	ピラゾレート・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロ	アールタイプフロアブル シュナイデンフロアブル	○	○	○	多年生広葉雑草													移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○	○		○	①SUR対策剤 ②早期栽培では葉害の恐れがあるので使用を避ける。						
27-27-2	ピラゾレート・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロ	アールタイプジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草													移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	SUR対策剤						
2-15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガンジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	非SU剤	
2-15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガン豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○	○	○	○	非SU剤	
15-0-2-27	カフェンストロール・ダイムロン・ペンシルフロンメチル・ベンゾピシクロン	シロノックLフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○			○	SUR対策剤	
15-0-2-27	カフェンストロール・ダイムロン・ペンシルフロンメチル・ベンゾピシクロン	シロノックLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○			○	SUR対策剤	
2-15-27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキトリオン	ベッカクジャンボ	○	○	○	多年生雑草													移植3日後～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	非SU剤						
2-15-27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキトリオン	ベッカク豆つぶ250	○	○	○	多年生雑草													移植3日後～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)	○	○	○	○	非SU剤						

# 除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										薬類・ 表層制御	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに 使用可	備考				
			ノビエ	一年生イネ科雑草	マツパイ	ホタルイ	ウリカワ	ミスガヤツリ	クロゲワイ	オモダカ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシノウエズメノヒエ			無人航空 機散布	湛水周 縁散布	水口 施用						
14-2-0	ピラクニル・プロピリスルフロ ン・プロモブチド	アツバレZ400FG	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植3日後～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)	○	○	○	○	SUR対策剤			
14-2-0	ピラクニル・プロピリスルフロ ン・プロモブチド	アツバレZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)	○		○	○	SUR対策剤
14-2-0	ピラクニル・プロピリスルフロ ン・プロモブチド	アツバレZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	SUR対策剤	
27-14- 2	テフリルトリオ ン・ピラクニ ル・プロピリス ルフロ	アットウZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)	○	○			①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
27-14- 2	テフリルトリオ ン・ピラクニ ル・プロピリス ルフロ	アットウZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
0-27-2	オキサジクロメ ホン・テフリルト リオン・メタゾ スルフロ	ディオーレフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
0-27-2	オキサジクロメ ホン・テフリルト リオン・メタゾ スルフロ	ディオーレジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
15-0-2	カフェンストー ル・ダイムロン ・メタゾスルフロ	月光フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)	○			○	SUR対策剤	
15-0-2	カフェンストー ル・ダイムロン ・メタゾスルフロ	月光ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	SUR対策剤	
27-14- 2	フェンキトリオ ン・ベントキサ ゾン・メタゾス ルフロ	流星ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植3日～ノビエ3葉 期(但し、移植後30 日まで)				○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
27-14- 2	フェンキトリオ ン・ベントキサ ゾン・メタゾス ルフロ	流星フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植3日～ノビエ3葉 期(但し、移植後30 日まで)				○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
27-2	テフリルトリオ ン・プロピリス ルフロ	ガツントZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)	○	○			①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
15-27- 2	イプフェンカルバ ゾン・テフリルト リオン・プロピ リスルフロ	カイリキZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)			○	○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
2-2- 15-27	ピラゾスルフロ ン・ピリフタ リド・プレチラ クロール・メソ トリオン	アビログロウMXジャン ボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	SUR対策剤	
2-2-27	ピリフタリド・ピ リスルファン・メ ソトリオン	ジャンダルムMXジャンボ トリオン	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植3日後～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	非SU剤			
2-2-27	ピリフタリド・ピ リスルファン・メ ソトリオン	ジャンダルムMX豆つぶ 250	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植3日後～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○	○		○	非SU剤			
0-27- 2-0	オキサジクロメ ホン・フェンキ トリオン・プロ ピリスルフロ ン・プロモブ チド	シンズイズジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植後3日～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。			
0-27- 2-0	オキサジクロメ ホン・フェンキ トリオン・プロ ピリスルフロ ン・プロモブ チド	シンズイズ豆つぶ250	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植後3日～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○	○	○	○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。			
27-2	テフリルトリオ ン・プロピリス ルフロ	ガツントZジャンボ フロ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後60日まで)				○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
27-2	テフリルトリオ ン・プロピリス ルフロ	ガツントZ200FG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後60日まで)	○	○		○	①SUR対策剤 ②早期栽培、砂壤土では葉害を生じる恐れがあるので使用 を避ける。	
27-14- 2	テフリルトリオ ン・ピラクニ ル・メタゾス ルフロ	コメツジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後5日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	SUR対策剤	
15-4-2	インダノファン ・クロメプロッ ペンシルフロ ン・メチル	マサカリLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後5日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	①SUR対策剤 ②移植後早い時期の処理で、高温が続く場合には一過性 の生育抑制が発生する場合がある。	
0-14-2	ダイムロン・ピ ラクニル・メ タゾスルフロ	銀河フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後5日～ノビエ3 葉期(但し、移植後 30日まで)				○	SUR対策剤	
0-14-2	ダイムロン・ピ ラクニル・メ タゾスルフロ	銀河ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後5日～ノビエ3 葉期(但し、収穫60 日前まで)				○	①SUR対策剤 ②コウキヤガラは草丈30cmまでの散布で、除草効果が高 い。	



# 除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										使用時期	他の使用方法			備考		
			ノビエ	一年生イネ科雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミスガヤツリ	クロゲワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草		キシユウスズメノヒエ	無人航空機散布	水口施用		WCS用イネに使用可	
2	ピリミノバックメテル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○														○	○	○	①非SU剤 ②ノビエの2葉期から4葉期が使用適期 ③処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ④移植前後の初期除草剤との体系で使用。	
2	ピリミノバックメテル	ヒエクリーン豆つぶ250	○														○	○	○	①非SU剤 ②ノビエの2葉期から4葉期が使用適期 ③ピリミノバックメテルは湛水が必要だが、ベンタゾンは水溶性が高いので確実に止水する(水口・水尻をしっかり止め)。深水にすると効果が落ちる。 ④散布後7日間は落水、かけ流しをしない。 ⑤散布後2日以内の降雨で効果が十分に得られない場合があるので、天候に注意する。 ⑥漏水田などでは使用しない。	
2・6	ピリミノバックメテル・ベンタゾン粒	ヒエクリーンバサグラン粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	①非SU剤 ②ノビエの2葉期から4葉期が使用適期 ③ピリミノバックメテルは湛水が必要だが、ベンタゾンは水溶性が高いので確実に止水する(水口・水尻をしっかり止め)。深水にすると効果が落ちる。 ④散布後7日間は落水、かけ流しをしない。 ⑤散布後2日以内の降雨で効果が十分に得られない場合があるので、天候に注意する。 ⑥漏水田などでは使用しない。	
0・2	ダイムロン・ペノキスラム	ワイドアタックD1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	①非SU剤 ②初期剤、一発処理剤との体系で使用。 ③落水することなく、湛水状態のままに散布する。	
6	ベンタゾンナトリウム塩	バサグラン液剤(ナトリウム塩)		○	○	○	○	○	○	○									○	①落水又は極浅水(雑草が水面上)にして散布し、散布後3～4日は入水、落水はしない。 ②処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になる。 ③ベンタゾンの葉害注意、DCPA剤との近接散布は避ける。 ④非SU剤	
2	ペノキスラム	ワイドアタックSC	○	○	○	多年生広葉雑草													○	①非SU剤 ②前処理剤との体系で使用。 ③展着剤は加用しない。 ④散布後2日間は入水、落水、かけ流しはしない。 ⑤イホクサ、ヒメソバキ、アゼガヤ、チヨウタゲ等には効果が低い。	
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキソトリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草										○			○	①非SU剤 ②高温条件では葉害を生ずることがある。	
1	シハロホップテル	クリンチャー1キロ粒剤	○														○			○	①移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫30日前まで) ②移植後25日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)
1	シハロホップテル	クリンチャージャンボ	○														○			○	①移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫30日前まで) ②移植後25日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)
1・6	シハロホップテル・ベンタゾン	クリンチャーバスメ液剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	非SU剤
1	シハロホップテル	クリンチャーEW	○														○			○	①散布液は使用当日に調製し、展着剤を加用する。 ②アゼガヤに適用あり、草丈60cmまでに散布する。
4	フロルピラウキシフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○	○	○	○	○	○	○	○										○	①非SU剤 ②幼穂形成期以降の散布では葉先の黄化や止葉の下垂が生じることがある。 ③いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがある。
2(SU)・2(SU)	ハロスルフロメテル・メタゾスルフロ	アレイルSC	○	○	○	多年生広葉雑草														①SUR対策剤 ②砂壤土では葉害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。	
4	2,4-PA	粒状水中2,4-D				イネ科以外の水田雑草														①非SU剤 ②雑草が水面下にかくれるくらいまでに湛水して散布し、散布後2～3日は落水しない。	
0	ACN	モゲトン粒剤				○											○	○	○	○	①極端な砂質土(漏水田)では使用しない。 ②極端な深水で使用すると葉害を生ずることがある。 ③ウキ草類に適用あり。 ④水口施用は藻類・表層剥離で適用。
2	ビスピリバックナトリウム塩	ノミニー液剤				クサネム・イボクサ														○	①茎葉処理剤。 ②湛水状態またはごく浅水状態にして、雑草の茎葉全体に薬剤が付着するようにする。 ③3日以上落水(浅水)状態を保つ。 ④クサネムとイボクサ対策に使用。 ⑤クサネムは再生する場合があるが着莢が減少する。 ⑥イボクサは本田内で再生し、伸長を始めた時期に散布する。