

除草1-2.直播水稲除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生											薬類・表層剥離	使用時期	WCS 用イネに使用可	備考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミスガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草				

は種前施用

9	グリホサートカリウム塩	ラウンドアップマックスロード	○	○	○	多年生雑草											○	①耕起前(雑草生育期) ②は種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培) ③耕起直後～出芽前(雑草生育期)(乾田耕起栽培)					
9	グリホサートイソプロピルアミン塩	草枯らし	○	○	○	多年生雑草											○	①耕起20～10日前(雑草生育期)1年生雑草のみ ②耕起直後～出芽前(雑草生育期)(乾田耕起栽培) ③は種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培)	①非SU剤 ②雑草茎葉散布 ③汎用除草剤の項参照				
9	グリホサートカリウム塩	タッチダウンiQ	○	○	○												○	①耕起前(雑草生育期) ②播種30日前～出芽前(雑草生育期)(乾田不耕起栽培)					
9・14	グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル	サンダーボルト007	○	○	○												○	耕起20～10日前(雑草生育期)					
22・22	ジクワット・パラコート	ブリグロックスL(毒)	○	○	○												○	秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、播種前14日～播種後7日(稲出芽前)					
27・27	ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン	ブレキープ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	湛水直播の代かき後～は種7日前又はは種直後～ノビエ1葉期(但し、収穫90日前まで)	①非SU剤 ②湛水散布又は無人航空機による散布

は種時施用(は種同時散布機で施用)

2・27	ピリミノバックメチル・フェンキトリオン	ペルーガ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	は種時	○	非SU剤
2・27	イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキトリオン	マスラオ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	は種時	○	SUR対策剤
27・27・2	ピラゾレート、ベンゾビシクロン、メタゾスルフロン	ジカマック500グラム粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	は種時	○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・27	トリアファモン・フェンキトリオン	プライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	は種時	○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンスルコンプリート1キロ粒剤 ポデーガードプロ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	は種時	○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③後作物としてなす、たまねぎおよびさやえんどうを栽培しない。
27・27	ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン	ブレキープ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	は種時	○	非SU剤
27	ピラゾレート	サンバード粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	は種時	○	①非SU剤 ②散布後5日間以上できるだけ長く、湛水状態を維持し、田面を露出させたり、水をきらしたりしないよう注意し、かけ流しや落水をさける。 ③湛水直播で落水出芽法をとる場合は、使用しない。
27	ピラゾレート	サンバード1キロ粒剤30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	は種時	○	④キカシグサ、ヒメソノハギなど1年生広葉雑草に効果が不十分な場合があり、多発田では後期除草剤との体系で使用する。
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○																	○	は種時	○	散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。