除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機散布	水口施用	湛水周縁散布		
播種後施用																							
27	ピラゾレート	サンバード粒剤	○	○	○	○	○	○										は種直後～ノビエ1葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①非SU剤 ②散布後5日間以上できるだけ長く、湛水状態を維持し、田面を露出させたり、水をきらしたりしないよう注意し、かけ流しや落水をさける。 ③湛水直播で落水出芽法をとる場合は、使用しない。 ④キカシグサなど1年生広葉雑草に効果が不十分な場合があり、多発田では後期除草剤との体系で使用する。
27	ピラゾレート	サンバード1キロ粒剤30	○	○	○	○	○	○										湛水直播のは種直後～ﾉﾋﾞｴ1葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①非SU剤 ②散布後5日間以上できるだけ長く、湛水状態を維持し、田面を露出させたり、水をきらしたりしないよう注意し、かけ流しや落水をさける。 ③湛水直播で落水出芽法をとる場合は、使用しない。 ④ヒメミソハギなど1年生広葉雑草に効果が不十分な場合があり、多発田では後期除草剤との体系で使用する。
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○															は種直後～稲出芽前				○	①ノビエの発生前～4葉期まで有効なので時期を失しないように散布する。 ②散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。 ③落水後、土壌が落ち着いたら散布する。
			○															イネ3葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	①ノビエの発生前～5葉期まで有効なので時期を失しないように散布する。 ②散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。
15	ベンチオカーブ	サターン乳剤	○	○	○	○												①は種直後～稲出芽前(入水15日前まで) ②稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期(但し、収穫90日前まで)(入水15日前まで)					非SU剤
27・27･2	ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	ジカマック500グラム粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ1.5葉期まで(但し、収穫90日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2･14･0	イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽始期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②出芽揃以降の使用を推奨する。
2･2･27	イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	マスラオ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	SUR対策剤
2･27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	非SU剤
2･27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期までの使用を推奨する。
2･27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)	○			○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14･2･27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14･2･27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラーフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③稲の根が露出する条件では薬害を生ずる可能性があるため、稲1葉期～ノビエ3葉期までの使用を推奨する。
14･2･27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラージャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14･2･27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)	○			○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機散布	水口施用	湛水周縁散布		
27･2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリート1キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
27･2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリートフロアブル ボデーガードプロフロアブル	○	○	○	○	○	○	○				○					は種直後～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○	○		○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
27･2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリートジャンボ ボデーガードプロジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①非SU剤 ②砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ③後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2･0･14･0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	SUR対策剤
2･0･14･0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLXフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	SUR対策剤
15･0･2･27	カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン	シロノックLフロアブル	○	○	○	○	○	○	○									イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15･0･2･27	カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン	シロノックLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○									イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15･2･27	イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン	ツルギフロアブル	○	○	○	○	○	○	○									イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15･2･27	イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン	ツルギジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15･2･27	イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン	ツルギ250粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2･0･14･0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLX400FG	○	○	○	○	○	○	○			○						イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日まで)	○		○	○	SUR対策剤
27･14･2	テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン	アットウZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27･2	テフリルトリオン・プロピリスルフロン	ガツントZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27･2	テフリルトリオン・プロピリスルフロン	ガツントZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○	○		○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27･2	テフリルトリオン・プロピリスルフロン	ガツントZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫60日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27･2	テフリルトリオン・プロピリスルフロン	ガツントZ200FG	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○	○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2･15･27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･15･27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカクジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･15･27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)	○			○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･27･15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウン1キロ粒剤 カウンシルエナジー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2･27･15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンジャンボ カウンシルエナジージャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機散布	水口施用	湛水周縁散布		
2・2・15・27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・2・15・27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・27・2	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空エアー粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
14・2・0	ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド	アッパレZ400FG	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○	○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・14・2	フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン	流星1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・14・2	フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン	流星フロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・14・2	フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン	流星ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・2・27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	非SU剤
2・2・27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMX豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○	○	非SU剤
2・27・15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンフロアブル カウンシルエナジーフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド	シンズイZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド	シンズイZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド	シンズイZジャンボ	○	○	○		○	○	○			○	○					イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド	シンズイZ豆つぶ250	○	○	○		○	○	○			○	○					イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・27・2	ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロン	アクシズMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○			○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	SUR対策剤
2・27	プロピリスルフロン・ランコトリオンナトリウム塩	フルスコアZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ2葉期～ノビエ3.5葉期まで(但し、収穫60日前まで)	○				①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・27	プロピリスルフロン・ランコトリオンナトリウム塩	フルスコアZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ2葉期～ノビエ3.5葉期まで(但し、収穫60日前まで)					①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機散布	水口施用	湛水周縁散布		
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン豆つぶ250	○															イネ3葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	稲の根が露出している条件では薬害を生ずる場合がある。
1・5・2・27	シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロンメチル・ペンゾビシクロン	ハイカット1キロ粒剤 サンバンチ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○					イネ3葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	①SUR対策剤 ②初期剤、一発処理剤との体系で使用する。 ③稲の根が露出している条件では薬害を生ずる場合がある。
2	ペノキススラム	ワイドアタックSC	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)				○	①非SU剤 ②前処理剤との体系で使用する。 ③展着剤は加用しない。 ④散布後2日間は入水、落水、かけ流しはしない。 ⑤ｲﾎﾞｸｻ、ﾋﾒﾐｿﾊｷﾞ、ｱｾﾞｶﾔ、ﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ等には効果が低い。
4	フロルピラウキシフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○		○			○	○			○						イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで)				○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
0・2	ダイムロン・ペノキススラム	ワイドアタックD1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	非SU剤
27・2	テフリルトリオン・ペノキススラム	ワイドショット1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○				非SU剤
2・27	ペノキススラム・ペンゾビシクロン	テッケン1キロ粒剤 ニトウリュウ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	非SU剤
2・27	ペノキススラム・ペンゾビシクロン	テッケンジャンボ ニトウリュウジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)				○	非SU剤
2・2・27	アジムスルフロン・ペノキススラム・メソトリオン	アトカラSジャンボMX セカンドショットSジャンボMX	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)					SUR対策剤
2・2	ハロスルフロンメチル・メタゾスルフロン	アレイルSC	○	○	○		○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで) ※出穂始期15日前まで					①SUR対策剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					イネ5葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)				○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2	ピリミスルファン	アトトリ1キロ粒剤								○	○							イネ5葉期～収穫45日前まで	○			○	①非SU剤 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ③砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2	ピリミスルファン	アトトリ豆つぶ剤								○	○							イネ5葉期～収穫45日前まで	○			○	非SU剤
1	シハロホップブチル	クリンチャー1キロ粒剤	○															①は種後10日～ノビエ3葉期(但し、収穫30日前まで) ②は種後25日～ﾉﾋﾞｴ4葉期まで(但し、収穫30日前まで)	○			○	①処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ②稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
1	シハロホップブチル	クリンチャージャンボ	○															は種後10日～ノビエ4葉期(但し、収穫30日前まで)				○	①稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
1	シハロホップブチル	クリンチャーEW		○														は種後10日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)				○	①落水状態で散布する。 ②広葉雑草が多い場合には、有効な剤と組み合わせて使用する。
1・6	シハロホップブチル・ベンタゾンナトリウム塩	クリンチャーバスME液剤	○	○	○	○	○	○	○									は種後10日～ノビエ5葉期(但し、収穫50日前まで)				○	①非SU剤　②散布液は使用当日に調製する。 ③重複散布を避ける。 ④高温が予想される時の使用は避ける。 ⑤展着剤は加用しない。 ⑥他剤とは混用しない。DCPA剤との近接散布は避ける。 ⑦効果が現れるまで10～14日要するので、誤まって散き直しをしない。
6	ベンタゾンナトリウム塩	バサグラン液剤(ナトリウム塩)			○	○	○	○	○	○	○							は種後35～50日(但し、収穫50日前まで)				○	非SU剤