

## 除草2-3. 大麦除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	多年生雑草	一年生雑草	一年生雑草(ツユクサ、カヤツクサ、キク・アブラナ科を除く)	一年生雑草(イネ科を除く)	一年生広葉雑草	スズメノテツポウ	県推奨使用時期	備考
9	グリホサートカリウム塩	タッチダウンIQ(普)		○					耕起又はは種前(雑草生育期) は種後出芽前(雑草生育期)	汎用除草剤の項参照
15 3 5	ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニユロン	クリアターナ乳剤(普)		○					は種直後(雑草発生前)	小麦除草剤の項参照
3 5	ペンディメタリン・リニユロン	カイタック乳剤(普)		○					は種直後(雑草発生前)	
12 3	ジフルフェニカン・トリフルラリン	ガレース乳剤(普)		○					は種後出芽前(雑草発生前)	小麦除草剤の項参照
15 5	プロスルホカルブ・リニユロン	ムギレンジャー乳剤(普)		○					は種後出芽前(雑草発生前)	小麦除草剤の項参照 ※ 少量散布の場合は専用ノズルを使用し、土壌の全面に均一に散布すること。
5 15	プロメトリン・ベンチオカーブ	サターンバアロ粒剤(普)		○					は種後～出芽前(雑草発生前) 生育初期(大麦の4葉期まで、スズメノテツポウ1.5葉期まで)	砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので、下限薬量で使用する。
15	プロスルホカルブ	ボクサー(普)		○					は種後～麦2葉期(雑草発生前～発始期)	
12 15	ジフルフェニカン・フルフェナセット	リベレーターG(普)		○					は種後～麦2葉期(雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで)	砂質土壌での使用は薬害を生じる恐れがあるので避ける。
12 15	ジフルフェニカン・フルフェナセット	リベレーターフロアブル(普)		○					は種後～麦3葉期(雑草発生前～イネ科雑草1葉期まで)	①出芽期の使用では、高薬量で薬害を生じる場合があるので注意する。 ②砂質土壌での使用は薬害を生じる恐れがあるので避ける。
2	チフェンスルフロンメチル	ハーモニー75DF水和剤(普)					○	○	は種後～節間伸長前	小麦除草剤の項参照