

野菜8. レタス

| 殺菌剤コード | 殺虫剤コード | 成分名 | 商品名 | すそ枯病 | べと病 | 灰色かび病 | 菌核病 | 斑点細菌病 | 軟腐病 | 腐敗病 | コガネムシ類幼虫 | ネキリムシ類 | カブラヤガ | オオタバコガ | ハスモンヨトウ | ヨトウムシ | アブラムシ類 | ケラ | ハモグリバエ類 | ナモグリバエ | ヒメフタテンヨコバイ | ウワバ類 | コオロギ類 | 備考 |
|--------|--------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|----------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|----|---------|--------|------------|------|-------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

は種前・殺菌剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 29 | | フルアジナム | フロンサイド粉剤 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

育苗期後半・殺菌剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 7 | | ピラジフルミド | パレード20フロアブル | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 育苗期後半～定植当日 |
|---|--|---------|-------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

定植前・殺菌剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|---------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 3 | | シメコナゾール | モンガリット粒剤 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | フルアジナム | フロンサイドSC | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フルアジナム | フロンサイド粉剤 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 40 | | フルオピコリド・ベンチア バリカルブイソプロピル | ジャストフィットフロアブル | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定植前日～定植当日 |

定植時・殺菌剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|----------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| P02 | | プロベナゾール | オリゼメート粒剤 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|----------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

は種前・殺虫剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-----------------------|
| | 4A | ジノテフラン | アルバリン粒剤 スタークル粒剤 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ミツバチに対して影響あり |
| | | チアメトキサム | アクタラ粒剤5 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | |
| 28 4A | | シアントラニプロール・ チアメトキサム | ミネクトデュオ粒剤 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり |

は種時・殺虫剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | 1B | ダイアジノン | ダイアジノン粒剤5 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | ミツバチに対して影響あり |
| | | イソキサチオン | ネキリエースK | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 28 4A | | シアントラニプロール・ チアメトキサム | ミネクトデュオ粒剤 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | は種覆土後～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり |

育苗期後半・殺虫剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|--------------------------|
| | 4A | チアメトキサム | アクタラ粒剤5 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり | |
| | | クロチアニジン | ダントツ粒剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり |
| | 28 | クロラントラニプロール | プレバソンフロアブル5 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | | 育苗期後半～定植当日 | |
| | | シアントラニプロール | ベリマークSC | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | 育苗期後半～定植当日 |
| | | シアントラニプロール | プリロツツ粒剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 育苗期後半～定植当日 |
| | | テトラニプロール | ヨーバルフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | 育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり。 |
| 28 4A | | シアントラニプロール・ チアメトキサム | ミネクトデュオ粒剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり | |
| | | クロラントラニプロール・ チアメトキサム | ジュリボフロアブル | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | 育苗期後半～定植当日。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり | |

野菜8. レタス

| 殺菌剤コード | 殺虫剤コード | 成分名 | 商品名 | すそ枯病 | べと病 | 灰色かび病 | 菌核病 | 斑点細菌病 | 軟腐病 | 腐敗病 | コガネムシ類幼虫 | ネキリムシ類 | カブラヤガ | オオタバコガ | ハスモンヨトウ | ヨトウムシ | アブラムシ類 | ケラ | ハモグリバエ類 | ナモグリバエ | ヒメフタテンヨコバイ | ウワバ類 | コオロギ類 | 備考 |
|--------|--------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|----------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|----|---------|--------|------------|------|-------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

定植前・殺虫剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| 4A | ジノテフラン | アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定植前日～定植時。 ミツバチに対して影響あり |
| | アセタミプリド | モスピラン粒剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4A 5 | イミダクロプリド・スピノサド | ガードナーフロアブル(劇) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定植3日前～定植当日 |
| | イミダクロプリド・スピノサド | ガードナーフロアブル(劇) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定植当日 |
| 5 | スピノサド | スピノエース顆粒水和剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ミツバチに対して影響あり |

定植時・殺虫剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| 1B | ダイアジノン | ダイアジノン粒剤5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ミツバチに対して影響あり |
| | イソキサチオン | ネキリエースK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定植時～生育初期 (但し、収穫21日前まで) |
| 3A | テフルトリン | フォース粒剤(劇) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ ミツバチに対して影響あり |
| 4A | クロチアニジン | ダントツ粒剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり |
| 28 4A | シアントラニリプロール・チアメトキサム | ミネクトデュオ粒剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ ○ ○ ○ ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり |

野菜8. レタス

| 殺菌剤コード | 殺虫剤コード | 成分名 | 商品名 | ア | オ | ハ | ヨ | ネ | ハ | ナ | ウ | ナ | カ | フ | ア | シ | | | | | 備考 |
|--------|--------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|----|
| | | | | ブラ | タ | ス | ト | キ | モ | モ | ワ | メ | タ | ザ | ロ | | | | | | |

定植後・殺虫剤

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | ハスモンヨトウ核多角体病ウイルス | ハスモン天敵 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1A | メソミル | ランネット45DF(劇) | ○ | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり | |
| | 1B | PAP | エルサン乳剤(劇) | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | ミツバチに対して影響あり | |
| | | アセフェート | オルラン水和剤 | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| | 3A | ベルメリン | ガードベイトA | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 生育初期。ミツバチに対して影響あり | |
| | 4A | ジノテフラン | アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ミツバチに対して影響あり | |
| | | イミダクロプリド | アドマイヤーフロアブル(劇) | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり |
| | | クロチアニジン | ダントツ水溶剤 | ○ | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり |
| | | チアメトキサム | アクタラ顆粒水溶剤 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり |
| | | ニテンピラム | ベストガード水溶剤 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アセタミプリド | モスピラン顆粒水溶剤(劇) | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 4C | スルホキサフロル | トランスフォームフロアブル | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ミツバチに対して影響あり | |
| | 5 | スピネトラム | ディアナSC | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ミツバチに対して影響あり | |
| | | スピノサド | スピノエース顆粒水和剤 | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ミツバチに対して影響あり |
| | 6 | エマメクチン安息香酸塩 | アフーム乳剤 | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり | |
| | | レビメクチン | アニキ乳剤 | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり |
| | 13 | クロルフェナピル | コテツフロアブル(劇) | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり | |
| | 15 | クロルフルアズロン | アタブロン乳剤 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | フルフェノクスロン | カスケード乳剤 | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ルフェスロン | マッチ乳剤 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18 | メキシフェノジド | ファルコンフロアブル | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | クロマフェノジド | マトリックフロアブル | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | 21A | トルフェンピラド | ハチハチ乳剤(劇) | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり | |
| | | | ハチハチフロアブル(劇) | ○ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 22A | インドキサカルブ | トルネードエースDF ファイントリムDF | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | |

