

野菜9. はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根くびれ病	根こぶ病	黄化病	尻腐病	軟腐病	菌核病	苗立枯病(リソクトニア菌)	ビシウム腐敗病	アブラムシ類	コナガ	ヨトウムシ	アオムシ	ネキリムシ類	ハイマダラノメイガ	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	コオロギ類	ケラ	ハスモンヨトウ	カブラハバチ	備考
--------	--------	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----	-----	---------------	---------	--------	-----	-------	------	--------	-----------	----------	----------	-------	----	---------	--------	----

定植まで

		バリオボラックス パラドクス	フィールドキーパー水和剤	○																				は種直後及び定植前日～当日	
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル						○	○														育苗期後半～定植当日	
21		アミスルプロム	オラクル粉剤	○							○													土壌混和での使用回数は2回以内であるが、そのうちの1回はおとり植物との同時使用を前提としている。作物の作付前の土壌混和处理での使用は1回に限る。	
		アミスルプロム	オラクル顆粒水和剤	○																					
		シアゾファミド	ランマンフロアブル	○																				定植前日～当日	
22		エタボキサム	エトフィンフロアブル	○																				定植前	
29		フルアジナム	フロンサイドSC	○		○	○																	定植前	
		フルアジナム	フロンサイド粉剤	○	○																				は種又は定植前
36		フルスルファミド	ネビジン粉剤	○																					は種又は定植前
		フルスルファミド	ネビリュウ	○																					播種又は定植前
36		フルスルファミド	ネビライト粉剤	○																					は種前又は定植前
1B		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5													○		○		○					は種時又は定植時。ミツバチに対して影響あり
		アセフェート	オルトラン粒剤 ジェイエース粒剤									○	○	○	○										定植時
		インキサチオン	ネキリエースK													○				○					は種時又は定植時～生育初期(但し、収穫14日前まで)
3A		ペルメトリン	ガードベイトA													○									は種時～生育初期。ミツバチに対して影響あり
		テフルトリン	フォース粒剤(劇)													○									定植時。ミツバチに対して影響あり

野菜9. はくさい

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	根くびれ病	根こぶ病	黄化病	尻腐病	軟腐病	菌核病	苗立枯病(リソクトニア菌)	ビシウム腐敗病	アブラムシ類	コナガ	ヨトウムシ	アオムシ	ネキリムシ類	ハイマダラノメイガ	キスジノミハムシ	コガネムシ類幼虫	コオロギ類	ケラ	ハスモンヨトウ	カブラハバチ	備考

定植まで

4A	イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤										○												定植時。ミツバチに対して影響あり
	チアメトキサム	アクタラ粒剤5										○	○	○										は種前 育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤										○												育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	ジノテフラン	スタークル粒剤 アルバリン粒剤										○	○	○										定植時。ミツバチに対して影響あり
	アセタミプリド	モスピラン粒剤										○	○	○										定植時 定植前日～定植当日
	クロチアニジン	ダントツ粒剤										○	○	○	○	○								は種時、育苗期後半、定植時。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
28	クロラントラニプロール	ブレバソフフロアブル5											○	○	○								○	育苗期後半～定植当日
	シアントラニプロール	ベリマークSC										○	○	○									○	カブラハバチ類で適用 育苗期後半～定植当日
	シアントラニプロール	プリロツソ粒剤										○	○	○										育苗期後半～定植当日、育苗期後半～定植時
	テトラニプロール	ヨーバルフロアブル										○	○	○	○	○							○	育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり。
28 4A	クロラントラニプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル										○	○	○									○	ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	シアントラニプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤										○	○	○									○	は種覆土後～育苗期後半。 ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
4A 5	イミダクロプリド・スピノサド	ガードナーフロアブル(劇)										○	○	○										定植3日前～定植当日

