

除草3. だいで除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生雑草	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	一年生広葉雑草	一年生雑草（アカザ科・アラナ科・タデ科を除く）	一年生雑草（ツクサ科を除く）	サ、キク・アブラナ科を除く）	県推奨使用時期	備考
9	グリホサートカリウム塩	タッチダウンiQ	○						耕起又はは種7日以前（雑草生育期）※	※コウキヤガラに適用あり 汎用除草剤の項参照
									は種後出芽前（雑草生育期）	
畦間処理：雑草生育期（但し収穫前日まで）										
					○				生育期（雑草生育期）（但し、収穫7日前まで）	専用の器具を用いて、作物に付着ないように塗布する。
9	グリホサートカリウム塩	ラウンドアップマックスロード	○						・耕起前または出芽前まで（雑草生育期） ・収穫前日まで（雑草生育期、畝間処理）	
9 14	グリホサートインプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル	サンダーボルト007	○						耕起前又はは種10日前まで（雑草生育期：草丈30cm以下）	
									畦間処理：雑草生育期（草丈30cm以下）（但し、収穫前日まで）	
									は種後出芽前（雑草生育期：草丈30cm以下）	
10	グルホシネート	バスタ液剤	○						は種前（雑草生育期）	汎用除草剤の項参照
									は種後出芽前（雑草生育期）	
									定植5日前まで（雑草生育期）	
									収穫28日前まで（畦間処理：雑草生育期）	
									収穫28日前まで（株間処理：本葉5葉期以降雑草生育期）	
3	トリフルラリン	トレファノサイド乳剤					○		は種前	① 覆土は必ず3cm以上とし鎮圧する。 ② 土壌が過湿の場合は使用しない。 ③ 一時に広範囲で使用する場合は、魚毒注意 ④ トレファノサイド粒剤2.5もある。 ⑤ 生育期（但し、収穫45日前まで）に畦間土壌表面散布可（大豆にかからないようにする）。また、使用量は実作業面積に応じた量とすること。 汎用除草剤の項参照
									は種後出芽前	
									定植前（植穴掘前）	
									生育期（但し収穫45日前まで）	
15 3 5	ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニユロン	クリアター乳剤	○						は種直後（雑草発生前）	① 大豆発芽後には使用しない。 ② 砂質、排水不良ほ場での使用は避ける。 ③ 碎土・整地は丁寧に、覆土は必ず2～3cmとする。 ④ 土壌が乾燥している場合は、効果が劣ることがあるので希釈水量を多めにし、適度な湿りを保つようにする。 ⑤ 過湿条件での使用は薬害発生を招くので避ける。 ⑥ タデには効果が劣る。
15 5	ジメテナミドP・リニユロン	エコトップP乳剤	○						は種後出芽前（雑草発生前）	① 大豆発芽後には散布しない。 ② 散布後の多量の降雨は薬害を生じる恐れがあるので天候を見極めて散布する。 ③ 眼及び皮膚に強い刺激性があるので注意する。 ④ エコトップP細粒剤Fあり
5 15	プロメトリン・S-メトラクロール	コダールS水和剤	○						は種後出芽前（雑草発生前）	
15	ジメテナミドP	フィールドスターP乳剤					○		は種後出芽前（雑草発生前）	
15 3 5	ジメテナミドP・ペンディメタリン・リニユロン	ブローラプラス乳剤	○						は種後出芽前（雑草発生前）	

除草3. だいで除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生雑草	一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く）	一年生広葉雑草	一年生雑草（アカザ科・アブラナ科・タデ科を除く）	一年生雑草（ツクサ科を除く）	一年生雑草（キク科・アブラナ科を除く）	県推奨使用時期	備考
15 5	アラクロール・リ ニユロン	ラクサー粒剤	○						は種後出芽前（雑草発 生前）	①土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、土壌が適 度の水分を含んでいるときに使用する。 ②排水不良及び過湿条件での使用は葉害発生を招くので避け る。 ③ラクサー乳剤あり
5 15	プロメトリン・ベン チオカーブ	サターンバアロ乳剤	○						は種後出芽前	①砕土、整地はていねいにする。 ②播種覆土後できるだけ早く雑草の発生前に使用する ③サターンバアロ粒剤もある。
15	アラクロール	ラッソー乳剤	○						は種後出芽前	汎用除草剤の項参照
22 22	ジクワット・パラ コート	ブリグロックスL（毒）	○						は種後出芽前雑草生育 期（草丈20cm以下） 畦間処理：雑草生育期 （草丈30cm以下）（但し 収穫3日前まで）	汎用除草剤の項参照
2	イマザモックスア ンモニウム塩	パワーガイザー液剤	○						大豆出芽揃期～本葉1 葉期、雑草発生始期～ 2葉期	周辺に飛散しないように注意する。（葉害）
14	フルチアセットメ チル	アタックショット乳剤			○				本葉2葉期～開花前（雑 草生育期）（但し、収穫 45日前まで）	①キク科、カヤツリグサ科には効果が劣るため、それら草種が優 先する場合は使用しない。 ②処理時に展開していた葉に褐斑を生じ、生育が遅れることがあ るので、気象条件、栽培条件等によりだいで生育不良の場合、 又は生育不良が予測される場合には使用しない。
1	セトキシジム	ナブ乳剤		○					雑草生育期（イネ科雑草 3～5葉期 但し、収穫30 日前まで） 雑草生育期（イネ科雑 草6～8葉期）（但し、収 穫30日前まで） 雑草生育期（イネ科雑草9 ～10葉期）（但し、収穫 30日前まで）	遅効性であり、イネ科雑草を完全に枯死させるまでに7～10日を要 するので、誤まってまき直しなどをしないように注意する。
1	キザロホップエチ ル	ポルトフロアブル		○					雑草生育期（イネ科雑 草の3～10葉期）収穫30 日前まで	①葉令の進んだ7～8葉期の一年生イネ科雑草に対しても高い効 果がある。 ②広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イ ネ科雑草優占圃場で使用する。 ③イネ科雑草を完全に枯殺するまでに約1週間を要するので、 誤ってまき直しなどしないように注意する。
6	ベンタゾンナトリ ウム塩	大豆バサグラン液剤（ナ トリウム塩）	○ イ ネ 科 を 除 く						だいで2葉期～開 花前（雑草の生育初期～6 葉期）但し、収穫45日前 まで だいで生育期（雑草 の生育初期～6葉期）但 し、収穫45日前まで	①アカザ科、ヒユ科、トウダイグサ科の雑草には効果が劣るのでこ れらの優占ほ場では使用しない。 ②葉害について ・大豆の葉に斑点、色抜け、黄変、萎縮症状の一過性の葉害を生 じる場合がある。 ③葉害を助長するので重複散布はしないこと。また、以下の場合 は葉害を助長するので使用を避けること。 ・著しい高温が続く場合 ・日射が強く蒸散が盛んな場合 ・低温、湿害、肥料不足によりだいで生育不良の場合
10	グルホシネートP ナトリウム塩	ザクサ液剤	○						収穫28日前まで（雑草 生育期 は種・定植前又 は畦間処理）	豆類（種実、ただし、らっかせいを除く）で登録 汎用除草剤の項参照