

R05 年度

エコやまぐち農産物 栽培管理記録

| | | | | |
|----|------------|------|-------|------|
| 品目 | 水稲 (コシヒカリ) | 認証区分 | エコ100 | エコ50 |
|----|------------|------|-------|------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | | | | |
| 市・町 (生産2号) コシヒカリ参照 | | 前作収穫終了 | 令和4年 9月28日 | (育苗等) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | たい肥施用 | 10月30日 | 育苗培土 | | | | | | 令和5年 4/6~5/8 | (苗・種子) ※ ベンレート水和剤 又は ダコニール1000 | ベノミル テトラクロイソフタロニリル | 殺菌 殺菌 | 1回 | 4/6~5/8 | | | | | |
| | | 耕起 | 12月15日 | (ほ場) | | | | | | | ドクターオリゼリテア | フルビリシ プロベナゾール | 殺虫 殺菌 | 1回 1回 | 4/28~5/29 | | | | | |
| | | 播種 | 令和5年 4/6~5/8 | たい肥 | | | | | | | (ほ場) アネシス | ピラゾスルフロンエチル フタクロール ベンゾビシクロン | 除草 除草 除草 | 1回 1回 1回 | 4/28~5/29 | | | | | |
| | | 定植 | 4/28~5/29 | クボタコート1 | 4.9kg/10a | 4.9kg/10a | | | 4/30~5/2 | | クインチャーEW 又は ロイヤント乳剤 | シロホップ フチル フロルビラキシフェンベンゾニル | 除草 除草 | 1回 | 6/8~7/15 | | | | | |
| | | 除草 | 6/8~7/15 | | | | | | | | プラシプロアブル | フェリムゾン フサライド | 殺菌 殺菌 | 1回 1回 | 7/14~8/16 | | | | | |
| | | 防除 | 7/14~8/16 | | | | | | | | Mr. ジョーカー | シラフルオフェン | 殺虫 | 1回 | 7/14~8/16 | | | | | |
| | | 収穫 | 9/4~ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量実績 | 出荷量実績 | 計 | | | 4.9 kg/10a | 4.9 kg/10a | 削減率 | | 計 | | | 10回 | 削減率 | | | | | | | |
| kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | | | 10.0 kg/10a | 51.0% | | 山口県基準 | | | 21回 | 52.0% | | | | | | | |

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。

| | | | | |
|----|------------|------|-------|------|
| 品目 | 水稻 (ひとめぼれ) | 認証区分 | エコ100 | エコ50 |
|----|------------|------|-------|------|

| ほ場番号 所在地 | 栽培 面積 (アール) | 作業実績 | | 使用資材実績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------|---------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | 作業名 | 時期 | 施肥・土づくり等 | | | | | 病害虫・雑草防除等 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 名称 | 成分含有率 N-P-K | 使用量 (kg/10a) | 窒素(N)量 (kg/10a) 全体 内化学肥料由来 | | 使用時期 | 名称 | 成分名 | 用途 | 使用成分回数 (回) | 使用時期 | | | | | | |
| 市・町 (生産2号) ひとめぼれ参照 | | 前作収穫終了 | 令和4年 9月28日 | (育苗等) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | たい肥施用 | 10月30日 | 育苗培土 | | | | | | 令和5年 3/20~3/24 | (苗・種子) ※ ベンレート水和剤 又は ダコニール1000 | ベノミル | 殺菌 | 1回 | 3/20~3/24 | | | | | |
| | | 耕起 | 12月15日 | (ほ場) | | | | | | | ドクターオセリア | フルリミン プロバザール | 殺虫 殺菌 | 1回 1回 | 4/30~5/2 | | | | | |
| | | 播種 | 3/31~4/6 | たい肥 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 定植 | 4/30~5/2 | クボタコート1 | 4.9kg/10a | 4.9kg/10a | | 4/28~5/29 | (ほ場) アネシス | ピラリスプロンエチル ブタロール ペンゾビシクロン | 除草 除草 除草 | 1回 1回 1回 | 4/30~5/2 | | | | | | | |
| | | 除草 | 6/8~7/15 | | | | | | クインチャーEW 又は ロイヤント乳剤 | シロホップ プチル フルビラキシフェンベンジル | 除草 除草 | 1回 | 6/8~7/15 | | | | | | | |
| | | 防除 | 7/14~8/11 | | | | | | ブラシプロアール | フェリムゾン フサライド | 殺菌 殺菌 | 1回 1回 | 7/14~8/16 | | | | | | | |
| | | 収穫 | 9/1~ | | | | | | Mr. ジョーカー | シフルオフェン | 殺虫 | 1回 | 7/14~8/16 | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収穫量実績 | 出荷量実績 | 計 | | 4.9 kg/10a | 4.9 kg/10a | 削減率 | 計 | | 10回 | 削減率 | | | | | | | | | | |
| kg/10a | kg/10a | 山口県基準 | | 10.0 kg/10a | 51.0% | 山口県基準 | | 21回 | 52.0% | | | | | | | | | | | |

使用する資材はすべて記載すること。

※苗・種子への使用農薬回数についても記載すること
 エコ100の申請において不使用の種子・苗の入手が困難な場合は、使用農薬について記入した上で、合計カウントしないこと。

用紙が1枚で不足する場合には複数枚利用すること
 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の内容を満たす別の任意様式が使われても構いませんが、削減率を追加記載してください。