

6 ミツバチ及びその訪花活動に対する農薬の影響

影響日数	農薬名			
	殺菌剤		殺虫剤	
ほとんど影響がない、または、薬液が乾けば影響ない	ICボルドー66D アミスター20フロアブル インプレッションクリア インプレッション水和剤 オーソサイド水和剤80 カリグリーン カンタスドライフロアブル ゲッター水和剤 ケンジャフロアブル コサイド3000 サンヨール ジーファイン水和剤 ジマンダイセン水和剤 ストロビーフロアブル	セイビアーフロアブル20 デランフロアブル トップジンM水和剤 トリフミン水和剤 ハーモメイト水溶剤 パンチョTF顆粒水和剤 フルピカフロアブル プロバティフロアブル ベルコート水和剤 ボトキラー水和剤 ラリー水和剤 ラリー乳剤 ランマンフロアブル	アカリタッチ乳剤 ウララDF カネマイトフロアブル サフオイル乳剤 サブリーナフロアブル ダニオーテフロアブル チェス顆粒水和剤 テデオ乳剤 デュアルサイド水和剤 デルフィン顆粒水和剤 ニッソラン水和剤 バシレックス水和剤 フーモン プレオフロアブル	ムシラップ ロムダンフロアブル 粘着くん液剤
処理翌日で影響なし	アフエットフロアブル アントラコール顆粒水和剤 イオウフロアブル エコショット オラクル顆粒水和剤 オルフィンフロアブル キノドーフロアブル グリーンカップ サブロール乳剤 サンリット水和剤 シグナムWDG ジャストミート顆粒水和剤 ショウチノスケフロアブル スミレックスくん煙顆粒 スミレックス水和剤 ゾーバックエンテクタSE ダコニール1000 トリフミンジェット	ネクスターフロアブル パレード20フロアブル パンチョTFジェット ピシロックフロアブル ファンタジスタ顆粒水和剤 ファンベル顆粒水和剤 フルピカくん煙剤 ベルコートフロアブル ベンレート水和剤 ミギワ10フロアブル ルビゲン水和剤 レーバスフロアブル ロブラールくん煙剤 ロブラール水和剤	アタブロン乳剤 アニキ乳剤 エコピタ液剤 エコマスターBT オレート液剤 カウンター乳剤 カスケード乳剤 グレーシア乳剤 コロマイト水和剤 コロマイト乳剤 サンクリスタル乳剤 スターマイトフロアブル ダニコングフロアブル ダニサラバフロアブル ダニトロンフロアブル トルネードエースDF ノーモルト乳剤 バリアード顆粒水和剤	バロックフロアブル ピラニカEW ファインセーブフロアブル ファルコンフロアブル フェニックス顆粒水和剤 プレバゾンフロアブル5 ベネビアOD ベリマークSC マイトクリーン マイトコーネフロアブル マッチ乳剤 マトリックフロアブル マブリック水和剤20 モスピラン顆粒水溶剤 モスピラン粒剤 モスピランジェット モベントフロアブル
安全日数 :2~3日			アーデント水和剤 アフーム乳剤	
安全日数 :3~7日	ポリオキシシンAL乳剤		サンマイトフロアブル スピノエース顆粒水和剤 ディアナSC	ハチハチフロアブル ベストガード水溶剤 マブリックジェット
安全日数 :7~10日	モレスタン水和剤		ネマキック粒剤 マラソン乳剤	
安全日数 :10~15日	カナメフロアブル		アグリメック コテツフロアブル	トランスフォームフロアブル
安全日数 :21日以上			カルホス乳剤 ダイアジノン粒剤3	ダイアジノン粒剤5 フォース粒剤
安全日数 :1~2か月			アクタラ粒剤5 アディオ乳剤 アドマイヤー1粒剤 スタークル/アルバリン粒	ダイアジノンSLブル ダントツ粒剤 ベストガード粒剤
施設でミツバチを放飼する場合は使用を避ける			コルト顆粒水和剤	

1. 本表は、メーカー技術資料及び各県（栃木県、静岡県、広島県、愛媛県、佐賀県）資料を参考に安全日数を設定した。

2. ほとんど影響がない剤であっても、薬液が乾かなかつたり、臭いが残る場合は、訪花活動に影響を及ぼす場合があるため、換気を十分に図り、薬液が乾いていることを確認のうえ、巣門を開ける。

3. ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにする。

4. 低温・曇雨天が続く場合は、薬剤の分解が進まず、遅くまで影響が残ることがある。