

野菜17. きゅうり

[illegible]

は種時・殺菌剤

[illegible]

定植前・殺菌剤

[illegible]

定植時・殺菌剤

[illegible]

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード		殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
					ハダニ類
					ケラ
					ウリハムシ幼虫
					コガネムシ類幼虫
					タネバエ
					トマトハモグリバエ
					ハモグリバエ類
					ネキリムシ類
					ミナミキイロアザミウマ
					ミカンキイロアザミウマ
					アザミウマ類
					オンシツコナジラミ
					コナジラミ類
					ワタアブラムシ
					アブラムシ類
					ネグサレセンチュウ
					ネコブセンチュウ

は種前・殺虫剤

[illegible]

育苗期・殺虫剤

[illegible]

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード		殺虫剤コード	一般名	商品名	備考
				ネコブセンチュウ	
				ネグサレセンチュウ	
				アブラムシ類	
				ワタアブラムシ	
				コナジラミ類	
				オンシツコナジラミ	
				アザミウマ類	
				ミカンキイロアザミウマ	
				ネキリムシ類	
				ハモグリバエ類	
				トマトハモグリバエ	
				タネバエ	
				コガネムシ類幼虫	
				ウリハムシ幼虫	
				ケラ	
				ハダニ類	

育苗期・殺虫剤

28	クロラントラニリブロール	プレバソンフロアブル5								○							育苗期後半～定植当日
	シアントラニリブロール	ベリマークSC		○	○	○				○							育苗期後半～定植当日
	テトラニリブロール	ヨーバルフロアブル		○	○					○							育苗期後半～定植当日 ミツバチに対して影響あり
4A 28	シアントラニリブロール・ チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤		○	○	○※				○							鉢上げ時～育苗期後半 ※鉢上げ時(育苗培土混和)にも適用。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
	アセタミプリド・シアントラニリブロール	アベイル粒剤		○	○	○							※				育苗期後半～定植当日 ※ウリハムシで適用

定植前・殺虫剤

[illegible]

定植時・殺虫剤

[illegible]

野菜17. きゅうり

[illegible]

定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜17. きゅうり

[illegible]

定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	つる枯病	べと病	疫病	灰色かび病	褐斑病	菌核病	黒星病	炭疽病	斑点細菌病	苗立枯病 (リソクトニア菌)	つる割病	備考
--------	--------	-----	-----	-------	------	-----	----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-------------------	------	----

定植後・殺菌剤

[illegible]

定植後・常温煙霧・殺菌剤

[illegible]

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード		殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
				クロバネキノコバエ類	
				ネコブセンチュウ	
				カメムシ類	
				ハスモンヨトウ	
				スジブトホコリダニ	
				ウリハムシ	
				トマトハモグリバエ	
				ハモグリバエ類	
				ウリノメイガ	
				ハダニ類	
				ミナミキイロアザミウマ	
				ミカンキイロアザミウマ	
				アザミウマ類	
				オンシツコナジラミ	
				コナジラミ類	
				ワタアブラムシ	
				アブラムシ類	

定植後・殺虫剤

[illegible]

野菜17. きゅうり

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ワタアブラムシ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	ハダニ類	ウリノメイガ	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ウリハムシ	スジブトホコリダニ	ハスモンヨトウ	カメムシ類	ネコブセンチュウ	クロバネキノコバエ類					備考
--------	--------	-----	-----	--------	---------	--------	-----------	--------	-------------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------	-----------	---------	-------	----------	------------	--	--	--	--	----

定植後・殺虫剤

	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤							○	○	○													
		ジフルベンズロン	デミリン水和剤							○															
		ルフェスロン	マッチ乳剤			○					○														
	16	ブプロフェジン	アプロード水和剤				※																		※オンシツコナジラミ幼虫で適用
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル								○														
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル								○														
	21A	ピリダベン	サンマイトフロアブル(劇)	○		○					○														
		フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル								○														
		トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○		○		○				○													皮ふに対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	21A 25B	フェンピロキシメート・ピフルブミド	ダブルフェースフロアブル								○														
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○		○		○			○														マルハナバチに対して影響あり
	25A	シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル								○														
		シエノピラフェン	スターマイトフロアブル								○														
	28	クロラントラニリプロール	プレパソンフロアブル5									○	○												
		フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤									○					○								
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○		○		○				○	○												ミツバチに対して影響あり。
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○		○		○		○		○	○				○								ミツバチに対して影響あり。
	29	フロニカミド	ウララDF	○		○																			
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤			○		○			○	○	○				○								
	33	アシノナビル	ダニオーテフロアブル								○														銅の注意事項を記載すること
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤			○																			高温時の薬害に注意。

定植後・常温煙霧・殺虫剤

	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○																					「温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所」で適用。きゅうり(施設栽培)で登録。ミツバチおよび野生ハナバチ類に対して影響あり
--	----	----------	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--