

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	根腐萎凋病	青枯病	萎凋病	ネキリムシ類	ネキリムシ	コガネムシ類幼虫	ケラ	アブラムシ類	コナジラミ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	トマトハモグリバエ	アザミウマ類	トマトサビダニ	ネコブセンチュウ	ハスモンヨトウ	トマトキバガ	備考
--------	--------	-----	-----	------	-------------------	-------	-----	-----	--------	-------	----------	----	--------	--------	---------	----------	-----------	--------	---------	----------	---------	--------	----

は種前・殺虫剤

	4A	ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤										○										ミツバチに対して影響あり
--	----	--------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

育苗期・殺虫剤

	3A	ベルメトリン	ガードベイトA						○														生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5											○									育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤											○									育苗期後半。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤											○	○								ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤											○									鉢上げ時。ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤										○	○				○					アザミウマ類のみ育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	28	クロラントラニプロール	ブレバソフフロアブル5											○	○						○		育苗期後半～定植当日
		シアントラニプロール	ブリロッソ粒剤										○	○	○			○					育苗期後半～定植時
			ベリマークSC										○	○	○			○			○		育苗期後半～定植当日
		テトラニプロール	ヨーバルフロアブル										○	○	○								育苗期後半～定植当日 ミツバチに対して影響あり。
	4A 28	アセタミプリド・シアントラニプロール	アペイル粒剤										○	○	○								育苗期後半～定植当日
		シアントラニプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤						○				○	○	○			○			○		鉢上げ時～育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

定植前・殺虫剤

--	--

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ネキリムシ類	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	コガネムシ類幼虫	ハダニ類	トマトキバガ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類	備考
--------	--------	-----	-----	--------	--------	---------	--------	-----------	----------------------------	---------	-----------	--------	--------	-------------	----------	------	--------	---------	----------	-----------	----------	-------	----

定植後・殺虫剤

4A		イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○			○																	ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)	○			○																	
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤				○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤				○														○			ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○			○			○														ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤	○																				ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○			○					○												クロバネキノコバエ類にも適用あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤	○			○																	ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤	○																				
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○			○					○												
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○			○											○						ミツバチに対して影響あり
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤		○					○		○												
		スピネトラム	ディアナSC		○	○	○			○		○												ミツバチに対して影響あり
	気5	脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE		○		○			○		○				○	○							トマトキバガ
	6	エマメクチン安息香酸塩	アフーム乳剤		○																			

野菜19. トマト

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	ハモグリバエ類	トマトハモグリバエ	ネキリムシ類	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	コガネムシ類幼虫	ハダニ類	トマトキバガ	トマトサビダニ	チャノホコリダニ	テントウムシダマシ	ネコブセンチュウ	カメムシ類	備考
--------	--------	-----	-----	--------	--------	---------	--------	-----------	----------------------------	---------	-----------	--------	--------	-------------	----------	------	--------	---------	----------	-----------	----------	-------	----

定植後・殺虫剤

	16	ブプロフェジン	アブロード水和剤					※1	※2															※1オンシツコナジラミ幼虫で適用 ※2タバココナジラミ幼虫で適用
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○																			
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル													○	○							
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF		○	○																		ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○	○											○							ミツバチに対して影響あり
		スピロテトラマト	モベントフロアブル	○			○					○					○							マルハナバチに対する影響あり
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○																		
		クロラントラニリプロール	ブレバソンフロアブル5		○					○							○							
		シアントラニリプロール	ベネビアOD	○	○		○			○		○												ミツバチに対して影響あり。アゾキシストロビンとは混用しない(薬害)
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル	○	○	○	○			○		○					○							ミツバチに対して影響あり
	29	フロニカミド	ウララDF	○			○							○										
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤		○	○	○			○		○						○						
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○	○				○							○							シロイチモジヨトウにも適用あり
M10	UN	キノキサリン系	モレスタン水和剤				○										○							
	34	フロメキン	アベンジャーフロアブル						○			○						○	</					