

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病 (リソクトニア菌)	苗立枯病	ネキリムシ類	ネコブセンチュウ	コガネムシ類 幼虫	ケラ	アブラムシ類	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	テントウムシダマシ若齢幼虫	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ハダニ類	チャノホコリダニ	ハスモンヨトウ	コナカイガラムシ類	備考
--------	--------	-----	-----	-------------------	------	--------	----------	--------------	----	--------	--------	-----------	---------------	---------	----------	--------	-------------	------	----------	---------	-----------	----

は種前・殺菌剤

M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80	○																		
-----	--	-------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

は種時・殺菌剤

M04		キャプタン	オーソサイド水和剤80	○																		は種後から2～3葉期
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤		○																	

は種時・殺虫剤

	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5				○		○													ミツバチに対して影響あり
--	----	--------	-----------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

育苗期・殺虫剤

	3A	ベルメリン	ガードベイトA				○															生育初期。ミツバチに対して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ粒剤5							○												育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤							○												育苗期後半。ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤							○	○			○								ミツバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤							○	○											育苗期後半。ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル							○	○					○		○	○			育苗期後半～定植当日。うどんこ病にも適用あり。マルハナバチに対する影響あり。
	28	クロラントラニリプロール	プレバゾンフロアブル5				○							○						○		育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール	ベリマークSC				○			○	○			○	○							育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル							○	○			○						○		育苗期後半～定植当日。オオタバコガにも適用あり。ミツバチに対して影響あり。
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤							○	○			○	○					○	○	ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり
		アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤							○	○				○							育苗期後半～定植当日

野菜21. なす

備考					
	コナカイガラムシ類				
	ハスモンヨトウ				
	チャノホコリダニ				
	ハダニ類				
	ミナミキイロアザミウマ				
	ミカンキイロアザミウマ				
	アザミウマ類				
	マメハモグリバエ				
	ハモグリバエ類				
	テントウムシダマシ若齢幼虫				
	オンシツコナジラミ				
	コナジラミ類				
	アブラムシ類				
	ケラ				
	コガネムシ類幼虫				
	ネキリムシ類				
	ネコブセンチュウ				
	苗立枯病 （リゾクトニア菌）				
	苗立枯病				
商品名					
成分名					
殺虫剤コード					
殺菌剤コード					

定植前・殺虫剤

[illegible]

定植時・殺虫剤

[illegible]

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	すすかび病	灰色かび病	褐紋病	青枯病	黒枯病	菌核病	疫病	褐色腐敗病	フザリウム立枯病	褐色斑点病	半身萎凋病	褐色円星病							備考
--------	--------	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	----	-------	----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	----

定植後・殺菌剤

[illegible]

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	うどんこ病	すすかび病	灰色かび病	褐紋病	青枯病	黒枯病	菌核病	疫病	褐色腐敗病	フザリウム立枯病	褐色斑点病	半身萎凋病	褐色円星病							備考
--------	--------	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	----	-------	----------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	----

定植後・殺菌剤

[illegible]

定植後・常温煙霧・殺菌剤

[illegible]

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ア ブ ラ ム シ 類	ハ ス モ ン ヨ ト ウ	オ オ タ バ コ ガ	ヨ ト ウ ム シ	カ ブ ラ ヤ ガ	コ ナ ジ ラ ミ 類	オ ン シ ツ コ ナ ジ ラ ミ	タ バ コ コ ナ ジ ラ ミ 類 (シルバリーフ コナジラミを含む)	テ ン ト ウ ム シ ダ マ シ 類	ハ モ グ リ バ エ 類	マ メ ハ モ グ リ バ エ	ハ ダ ニ 類	チ ャ ノ ホ コ リ ダ ニ	ア ザ ミ ウ マ 類	ミ カ ン キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ	ミ ナ ミ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ	カ ス ミ カ メ ム シ 類	カ メ ム シ 類	ア ズ キ ノ メ イ ガ	コ ナ カ イ ガ ラ ム シ 類	備考
--------	--------	-----	-----	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	---	---	--	---------------------------------	--------------------------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------------	---	---	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---	----

定植後・殺虫剤

19		ポリオキシシン	ポリオキシシンAL水溶剤												○	○									うどんこ病、すすかび病、 灰色かび病にも適用あり
	気	脂肪酸グリセリド	サンクリスタル乳剤	○					○						○	○									
		MEP	スミチオン乳剤	○								○													
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5																						コガネムシ類に適用。ミツ バチに対して影響あり
	3A	アクリナトリン	アーデント水和剤	○	○										○		○								
		シベルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)	○						○									○						
		ペルメトリン	アディオナ乳剤	○						○		○									○				ミツバチに対して影響あ り
		エトフェンプロックス	トレボン乳剤	○						○															
		ペルメトリン	ガードベイトA																						ネキリムシ類に適用。生 育初期。ミツバチに対 して影響あり
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	○						○			○	○					○						ミツバチ及びマルハナバ チに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)	○						○							○								ミツバチ及び野生ハナバ チ類に対して影響あり
			アドマイヤーフロアブル(劇)	○													○								
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤	○						○															ミツバチに対して影響あ り
			アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤	○						○							○				○				ミツバチに対して影響あ り
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤	○						○			○	○					○		○				ミツバチ及びマルハナバ チに対して影響あり
			ダントツ粒剤	○																					ミツバチ及びマルハナバ チに対して影響あり
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤	○						○									○		○				
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)	○						○			○				○							○	
	4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル	○						○															ミツバチに対して影響あ り
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤			○											○								
		スピネトラム	ディアナSC		○	○				○				○			○								ミツバチに対して影響あ り
	5	脂肪酸グリセリド・スピノ サド	ダブルシューターSE			○				○				○		○	○								
	6	ミルベメクチン	コロマイト乳剤							○				○		○	○								
		エマメクチン安息香酸塩	アフーム乳剤		○	○				○				○		○	○	○							
		レピメクチン	アニキ乳剤		○	○				○				○			○								ミツバチ及びマルハナバ チに対して影響あり
		アバメクチン	アグリメック(劇)							○						○	○								

野菜21. なす

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	ヨトウムシ	カブラヤガ	コナジラミ類	オンシツコナジラミ	タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む)	テントウムシダマシ類	ハモグリバエ類	マメハモグリバエ	ハダニ類	チャノホコリダニ	アザミウマ類	ミカンキイロアザミウマ	ミナミキイロアザミウマ	カスミカメムシ類	カメムシ類	アズキノメイガ	コナカイガラムシ類	備考
--------	--------	-----	-----	--------	---------	--------	-------	-------	--------	-----------	----------------------------	------------	---------	----------	------	----------	--------	-------------	-------------	----------	-------	---------	-----------	----

定植後・殺虫剤

	9B	ピメロジン	チェス顆粒水和剤	○					○															
		ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○					○									○						
	10A	ヘキシチアゾクス	ニッソラン水和剤										○											
	10B	エトキサゾール	パロックフロアブル										○											
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○	○	○			○			○	○		○	○							ナスの幼苗期(1～3葉期)には使用しない。ミツバチに対して影響あり
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤		○	○												○			○			
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤				○						○	○				○			○			「千両2号」「みず茄子」では、果実に薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。また、浸透性を高める効果のある展着剤の加用は、薬害を生じる恐れがあるので避ける。
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤		○				○															
		ルフエヌロン	マッチ乳剤			○																		
	18	メキシフェノジド	ファルコンフロアブル		○	○																		
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○	○																		
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル											○	○									
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル											○										
	21A	フェンピロキシメート	ダニトンフロアブル											○										
	21A 25B	ビフルブミド・フェンピロキシメート	ダブルフェースフロアブル											○	○									
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF		○	○				○														ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○	○				※														※ニジュウヤホシテントウで適用。ミツバチに対して影響あり
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル	○					○					○	○	○						※		※ナスコナカイガラムシで適用。うどんこ病にも適用あり。マルハナバチに対する影響あり
	25A	シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル											○										

野菜21. なす

殺菌剤コード		殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
				コナカイガラムシ類	
				アズキノメイガ	
				カメムシ類	
				カスミカメムシ類	
				ミナミキイロアザミウマ	
				ミカンキイロアザミウマ	
				アザミウマ類	
				チャノホコリダニ	
				ハダニ類	
				マメハモグリバエ	
				ハモグリバエ類	
				テントウムシダマシ類	
				タバココナジラミ類（シルバーリーフコナジラミを含む）	
				オンシツコナジラミ	
				コナジラミ類	
				カブラヤガ	
				ヨトウムシ	
				オオタバコガ	
				ハスモンヨトウ	
				アブラムシ類	

定植後・殺虫剤

[illegible]

定植後・常温煙霧・殺虫剤

[illegible]