果樹5. なし

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ニセナシサビダニ	アブラムシ類	カイガラムシ類	コナカイガラムシ類	クワコナカイガラムシ	カメムシ類	ハマキムシ類	シンクイムシ類	ナシヒメシンクイ	ナシホソガ	ナシチビガ	ケムシ類	ナシグンバイ	チュウゴクナシキンゾウミ	ナシミハバチ	アザミウマ類	カミキリムシ類	ナシハバチ		備考

殺虫剤1 (ダニ剤・ダニ類に効果の高い薬剤)

	(気)	マシン油	ハーベストオイル	○	○	○																			
	6	ミルベメクテン	コロマイト水和剤	○	○																				
	10A	ヘキシチアゾクス	ニッソラン水和剤	○																					
	13	クロルフェナビル	コテツフロアブル(劇)	※	○																				※ナミハダニ、カンザワハダニで適用 ヨモギエダシヤク、チャノキイロアザミウマに適用あり ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり
	18	テブフェンジド	ロムダンフロアブル							○						○									
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル	○	○																				交配から交配後30日までは使用しない。
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル	○																					
	21A	ピリダベン	サンマイト水和剤(劇)	○	○	○											○								※ハダニ類、ミカンハダニに適用。ミツバチに対して影響あり。
		フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル	○	○																				
	23	スピロメシフェン	ダニゲッターフロアブル	○	○																				
		スピロテトラマト	モベントフロアブル	○	○	○	○															○			
	25	シエノピラフェン	スターマイトフロアブル	○																					
		シフルメトフェン	ダニサラバフロアブル	○																					
	25B	ビフルブミド	ダニコングフロアブル	○																					
	33	アソナビル	ダニオーテフロアブル	○																					銅剤との混用は避ける。本剤を使用した後に銅剤を使用する場合は10日以上散布間隔を空ける。銅剤を散布した後は本剤の使用を避ける。

果樹5. なし

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ニセナシサビダニ	アブラムシ類	カイガラシ類	コナカイガラシ類	クワコナカイガラシ類	カメムシ類	ハマキムシ類	シンクイムシ類	ナシヒメシンクイ	ナシホソガ	ナシチビガ	ケムシ類	ナシゲンバイ	チュウゴクナシキジラミ	アザミウマ類	カミキリムシ類	ナシミハバチ	備考

殺虫剤2(その他)

1A	NAC	マイクロデナボン水和剤85(劇)			○				○						○	○						日本なしで適用 ミツバチに対して影響あり。
	アラニカルブ	オリオン水和剤40(劇)			○	○					○	○				○						ミツバチに対して影響あり。
	CYAP	サイアノックス水和剤			○				○	○												ミツバチに対して影響あり。
3A	シベルメトリン	アグロスリン水和剤(劇)			○				○	○				○								アブラゼミに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
	アクリナトリン	アーデント水和剤	○	○					○	○												ミツバチに対して影響あり。
	ピフェントリン	テルスター水和剤	○	○					○	○				○								ミツバチに対して影響あり。
	フルバリネート	マブリック水和剤20(劇)	○	○	○				○	○				○	○							
	フェンプロバトリン	ロビンフッド																		○		スカシバ類、ヒメボクトウにも適用あり。 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差し込み噴射
4A	チアメキサム	アクタラ顆粒水溶剤			○	○			○	○												ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	イミダクロプリド	アドマイヤー水和剤(劇)			○				○													ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)			○																	
	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤			○	○			○	○						○	○					ミツバチに対して影響あり
	クロチアニジン	ダントツ水溶剤			○	○			○	○						○	○					ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)			○	○				○	○			○								カキノヒメヨコバイに適用あり。 長十郎、新高、八雲、愛甘水に対しては葉に黒変の葉害を生じることがあるので使用しない。
4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロアブル			○	○																ミツバチに対して影響あり。
5	スピネトラム	ディアナWDG								○	○									○		ミツバチに対して影響あり。
29	フロニカミド	ウララDF			○																	チャノキイロアザミウマに適用あり。
9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤			○	○														○		チャノキイロアザミウマに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
15	テフルベンズロン	ノーモルト乳剤									○			○	○							
16	ブプロフェジン	アブロード水和剤				○																カイガラムシ類は幼虫で適用
	ブプロフェジン	アブロードフロアブル				○																
18	クロマフェノジド	マトリックフロアブル								○												
21A	トルフェンビラド	ハチハチフロアブル(劇)			○	○			○											○	○	ミツバチに対して影響あり。
28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤								○	○					○						
	フルベンジアミド	フェニックスフロアブル								○	○					○						フタモンマダラメイガ、ヒメボクトウにも適用
	クロラントラニプロール	サムコルフロアブル10								○	○					○						ヒメボクトウにも適用。
	シアントラニプロール	エクシレルSE				○				○	○					○						ヒメボクトウにも適用。マメコバチに対して影響あり。
	テトラニプロール	ヨーバルフロアブル				○				○	○									○		ヒメボクトウにも適用。ミツバチに対して影響あり。