# 除草1−1移植水稲除草剤

| HRACコード | 成分名 | 商品名 | 一年生 | | | 多年生 | | | | | | | | | | | 藻類・表層剥離 | WCS用イネに使用可 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ノビエ | 一年生イネ科雑草 | 一年生広葉雑草 | マツバイ | ホタルイ | ウリカワ | ミズガヤツリ | クログワイ | オモダカ | セリ | ヒルムシロ | コウキヤガラ | 多年生イネ科雑草 | キシュウスズメノヒエ | | | |
| 移植までに施用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14･15 | オキサジアゾン・ブタクロール | デルカット乳剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | ・植代時（移植4日前まで）に使用する。<br>・混和時の水深は3～5cmとし、薬剤が深く入らないようにする。<br>・移植後の深水により薬害（葉鞘褐変）発生の場合あり。<br>・処理後、漏水しないよう止水する。また、移植時に排水しない。 |
| 15･14 | ブタクロール・ペントキサゾン | サキドリEW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ・植代後～移植前7日の使用可（漏水防止、移植時排水厳禁）。<br>・ホタルイ、ミズガヤツリに効果がやや劣る場合があるので、有効な後処理剤との体系処理で使用する。 |
| 15･27 | プレチラクロール・ベンゾフェナップ | ユニハーブフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | ・植代時～移植前7日まで（早期栽培地帯では壌土～埴土）の使用可。<br>・低温で活着遅延が予想される場合には使用を避ける。<br>・オモダカ対策は有効な後処理剤との体系処理を行う。 |
| 移植時に田植同時散布機で施用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2･15･27 | ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン | ベッカク1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| 33･27･2 | シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート | ジャスタ1キロ粒剤<br>クサウェポン1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。<br>・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 |
| 33･27･2 | シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート | ジャスタフロアブル<br>クサウェポンフロアブル | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 |
| 2･27･15 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド | カウントダウン1キロ粒剤<br>カウンシルエナジー1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | | ○ | ・後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 |
| 2･27･15 | トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド | カウントダウンフロアブル<br>カウンシルエナジーフロアブル | ○ | ○ | ○ | 多年生雑草 | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 2･14･27 | トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン | アシュラ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。<br>・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 |
| 2･14･27 | トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン | アシュラフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・早期栽培及び砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。<br>・後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 |
| 2･27 | トリアファモン・フェンキノトリオン | プライオリティ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 2･27 | トリアファモン・フェンキノトリオン | プライオリティフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 27･14･2 | テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン・ | アットウZ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| 15･2･27 | イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン | ツルギフロアブル | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | ○ | ・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 15･2･27 | イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ベンゾビシクロン | ツルギ250粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | ○ | ・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |

# 除草1-1移植水稲除草剤

| HRACコード | 成分名 | 商品名 | 一年生 | | | 多年生 | | | | | | | | | | | 藻類・表層剥離 | WCS用イネに使用可 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ノビエ | 一年生イネ科雑草 | 一年生広葉雑草 | マツバイ | ホタルイ | ウリカワ | ミズガヤツリ | クログワイ | オモダカ | セリ | ヒルムシロ | コウキヤガラ | 多年生イネ科雑草 | キシュウスズメノヒエ | | | |
| 27･27･2 | ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン | アールタイプ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | ○ | ・早期栽培及び砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 2･2･27 | ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン | ジャンダルムMX1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | ○ | ・早期栽培及び砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 15･27･2 | フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン | 天空1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| 2･0･14･0 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド | バッチリLX1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| 33･27･2 | シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン | ウルティモZ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 0･27･2 | オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン | ディオーレ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | 多年生広葉雑草 | | | | | | | | | | | | ○ | |
| 2･14･0 | イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド | バッチリ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 2･0･14･0 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド | バッチリLXフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| 2･0･14 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル | サラブレッドKAI1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 2･0･14 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル | サラブレッドKAIフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 0･14･2 | ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン | 銀河1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| 2･27･14 | イマゾスルフロン・テフリルトリオン・ピラクロニル | キラリ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 2･27･14 | イマゾスルフロン・テフリルトリオン・ピラクロニル | キラリフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 14･2･0 | ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド | アッパレZ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 2･15 | ピリミスルファン・フェノキサスルホン | ガンガン1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 14･2･27 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン | エンペラー1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 14･2･27 | ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン | エンペラーフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 15･27･2 | フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン | アカツキ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 2･0･14･0 | イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド | サラブレッドGO1キロ粒剤(普) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 27･14･2 | フェンキノトリオン、ペントキサゾン、メタゾスルフロン | 流星1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 0･15･27･2 | ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル | ラオウフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 15･27 | イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン | キマリテフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 15･0･2 | カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン | 月光1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | |

# 除草1-1移植水稲除草剤

| HRACコード | 成分名 | 商品名 | 一年生 | | | 多年生 | | | | | | | | | | | 藻類・表層剥離 | WCS用イネに使用可 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ノビエ | 一年生イネ科雑草 | 一年生広葉雑草 | マツバイ | ホタルイ | ウリカワ | ミズガヤツリ | クログワイ | オモダカ | セリ | ヒルムシロ | コウキヤガラ | 多年生イネ科雑草 | キシュウスズメノヒエ | | | |
| 15・27・2 | イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル | カチボシ1キロ粒剤51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| 15・27・2 | イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル | カチボシLフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| 2・2・15・27 | ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン | アピログロウMX1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| 14・27・27 | ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン | イネキング1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | ・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 14・27・27 | ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン | イネキングフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | ○ | |
| 2・27 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン | ベルーガ1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 2・27 | ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン | ベルーガフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 |
| 5・27・15 | シメトリン・ピラゾキシフェン・プレチラクロール | ワンオールS1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ○ | ・レンコン隣接田での使用可能。<br>・減水深1.5cm/日以下（早期は1.0cm/日以下）で使用。 |
| | フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル | イノーバトリオLフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ①SUR対策剤<br>②セリ多発田では効果の高い薬剤との体系処理が望ましい。 |
| 15・0・2 | フェントラザミド・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル | ザークDX1キロ粒剤51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | プレチラクロール・ベンゾフェナップ | ユニハーブフロアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | ○ | ①低温で活着遅延が予想される場合には使用を避ける。<br>②オモダカ対策は有効な後処理剤との体系処理を行う。 |
| 15・14 | ブタクロール・ペントキサゾン | サキドリEW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | ・ホタルイ、ミズガヤツリに効果がやや劣る場合があるので、有効な後処理剤との体系処理で使用する。 |
| 0・14 | ブロモブチド・ペントキサゾン | ショキニー1キロ粒剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | |