

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに使用可	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ			多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ	無人航空機			水口施用	湛水周縁散布																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
移植後施用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4・2・2	フロルピラウキシ フェンベンジル・ ベノキススラム・ ベンゾビシクロン	ウィードコア200SD粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

移植後施用

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										漢類・表層剥離 キシュウスイメノヒエ	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに使用可	備 考	
			ノビエ	一年生イネ科雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布			
15	プレチクロール	エリジャン乳剤	○	○	○	○										移植直後～ノビエ1 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・植代時～移植前7日までの使用可。	
5・27・ 15	シメトリン・ピラゾ キシフェン・プレ チクロール	ワンオールS1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○					○			移植直後～ノビエ2 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・レンコン隣接田での使用可能。 ・減水深1.5cm/日以下(早期は1.0cm/日以下)で使用。 ・イネ1.5葉期までの使用が望ましい。	
15・2・ 27	イブフェンカルバ ゾン・イマズスル フロンのベンゾビ シクロン	ツルギフロアブル	○	○	○	多年生広葉雑草									移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。		
15・2・ 27	イブフェンカルバ ゾン・イマズスル フロンのベンゾビ シクロン	ツルギジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草									移植直後～ノビエ2.5 葉期 但し、移植後30 日まで				○			
15・2・ 27	イブフェンカルバ ゾン・イマズスル フロンのベンゾビ シクロン	ツルギ250粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草									移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○	○	○			
27・27・ 2	ピラゾレート・ベン ゾビシクロン・メ タズスルフロンの	アールタイプ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草									移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・早期栽培、砂壌土では早い処理で薬害の恐れがあるので 移植後3日以降に使用する。		
2・0・ 14・0	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド	パッチリLX400FG	○	○	○	多年生広葉雑草									移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	○		
2・0・ 14・0	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド	パッチリLX1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草								○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)				○			
2・14・0	イマズスルフロ ン・ピラクロニル・ プロモブチド	パッチリ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	
2・0・14	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル	サラブレッドKAI1キロ粒 剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	
2・0・14	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル	サラブレッドKAIフロアブ ル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	
2・0・14	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル	サラブレッドKAIジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	
2・0・ 14・0	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド	パッチリLXフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	
2・0・ 14・0	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド	パッチリLXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	
2・27・ 14	イマズスルフロ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル	キラリ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27・ 14	イマズスルフロ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル	キラリフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27・ 14	イマズスルフロ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル	キラリジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27・ 14	イマズスルフロ ン・テフリルトリ オン・ピラクロニ ル	キラリ400FG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○	○	・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・0・ 14・0	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド	サラブレッドGO1キロ粒 剤(菅)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○				・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
2・0・ 14・0	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド	サラブレッドGO400FG (菅)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
2・0・ 14・0	イマズスルフロ ン・オキサジクロ メホン・ピラクロ ニル・プロモブチ ド	サラブレッドGOジャンボ (菅)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○				・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										薬類・表層剥離 キシュウスズメノヒエ 多年生イネ科雑草	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに使用可	備 考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	無人航空機			水口施用	湛水周縁散布			
2・0・ 14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・プロモブチド	サラブレッドG0フロアブル(昔)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○			・砂壤土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
0・15・ 27・2	ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ペンシルフロロンメチル	ラオウジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)			○		・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
0・15・ 27・2	ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ペンシルフロロンメチル	ラオウフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)		○	○		・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
15・27・ 2	イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ペンシルフロロンメチル	カチボシ1キロ粒剤51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○		
15・27・ 2	イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ペンシルフロロンメチル	カチボシLフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○	○		
15・27・ 2	イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ペンシルフロロンメチル	カチボシLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)			○		
14・27・ 27	ピラクロニル・ピラゾレート・ペンゾビシクロン	イネキング1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○		
14・27・ 27	ピラクロニル・ピラゾレート・ペンゾビシクロン	イネキングフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ2.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○	○		
2・15・ 27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草								○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)			○			
15・27・ 2	フェントラザミド・ペンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草								○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○			
15・27・ 2	フェントラザミド・ペンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空フロアブル	○	○	○	多年生広葉雑草									移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○	・移植3日後以降の使用を推奨する。		
14・2・ 27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー豆つぶ250	○	○	○	多年生広葉雑草								○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、収穫60日 まで)	○	○	○	○		
14・2・ 27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、収穫60日 まで)	○		○		
14・2・ 27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラーフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○	○		
14・2・ 27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラージャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)			○		
2・15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガン1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○		
14・2・0	ピラクロニル・プロピリスルフロ ン・プロモブチド	アッパレZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○		
15・27・ 2	フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン	アカツキ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、収穫60日 前まで)	○		○	・早期栽培、砂壤土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。	
15・27・ 2	フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン	アカツキフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)			○	・早期栽培、砂壤土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。	
15・27・ 2	フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン	アカツキジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、収穫60日 前まで)			○	・早期栽培、砂壤土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。	
15・27・ 2	フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン	アカツキ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、収穫60日 前まで)	○	○	○	・早期栽培、砂壤土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。	
0・14・2	ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン	銀河1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、収穫60日 前まで)	○		○		

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										薬 類 ・ 表 層 剥 離	使用時期	他の使用方法			W C S 用 イ ネ に 使 用 可	備 考		
			ノ ビ エ	一 年 生 イ ネ 科 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	マ ツ バ イ	ホ タ ル イ	ウ リ カ ワ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	ク ロ グ ワ イ	オ モ ダ カ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	コ ウ キ ヤ ガ ラ			多 年 生 イ ネ 科 雑 草	キ シュ ウ ス ズ メ ノ ヒ エ	無 人 航 空 機			水 口 施 用	湛 水 周 縁 散 布
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○			
27・14・2	フェンキノトリオン、ペントキサゾン、メタゾスルフロン	流星1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○	・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。			
2・2・15・27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アビログロウMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○			
15・27	イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン	キマリテフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○	・早期栽培、砂壌土では早い処理で薬害の恐れがあるので移植後5日以降に使用する。			
15・27	イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン	キマリテジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)		○	○	・早期栽培、砂壌土では早い処理で薬害の恐れがあるので移植後5日以降に使用する。			
15・0・2	カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン	月光1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○			
4・27・15	クロメブロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド	イネリーグジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○			
4・27・15	クロメブロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド	イネリーグ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○			
4・27・15	クロメブロップ・テフリルトリオン・フェントラザミド	イネリーグフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・移植5日後以降の使用を推奨する。		
15・27・4	イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・フルピラウキシフェンベンジル	サキガケ薬粒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。		
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○			
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガフロアブル	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)		○		○			
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガジャンボ	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。		
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		移植直後～ノビエ3 葉期(但し、収穫75日 前まで)	○	○	○	○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。		
33・2・27	シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート	ジャスタ1キロ粒剤 クサウェボン1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草										○	移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○	・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。		
33・2・27	シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート	ジャスタフロアブル クサウェボンフロアブル	○	○	○	多年生雑草										○	移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。	
2・27・15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウン1キロ粒剤 カウンシルエナジー1キ ロ粒剤	○	○	○	多年生雑草											移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。	
2・27・15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンフロアブル カウンシルエナジーフロ アブル	○	○	○	多年生雑草											移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	・後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。	
2・27・15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンジャンボ カウンシルエナジージャン ボ	○	○	○	多年生雑草											移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・ノビエ3葉期までの使用を推奨する。 ・後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。	
2・27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティジャンボ	○	○	○	多年生雑草											移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)					○	
2・27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ豆つぶ25 0	○	○	○	多年生雑草											移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○	○			
2・27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○		

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生			多年生										薬 類・ 表層剥離	使用時期	他の使用方法			W C S 用 イ ネ に 使 用 可	備 考
			ノ ビ エ	一 年 生 イ ネ 科 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	マ ツ バ イ	ホ タ ル イ	ウ リ カ ワ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	ク ロ グ ワ イ	オ モ ダ カ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	コ ウ キ ヤ ガ ラ	多 年 生 イ ネ 科 雑 草	キ シュ ウ ス ズ メ ノ ビ エ		無 人 航 空 機	水 口 施 用	湛 水 周 縁 散 布		
2・27	トリアファモン・ フェンキノトリオン	ブライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	
27・2	テフリルトリオン・ トリアファモン	カウンシルコンブリー1 キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ 粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・後作物となす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 ・移植5日後からの使用を推奨する。
2・2・27	ピリフタリド・ピリ ミスルファン・メソ トリオン	ジャンダルムMX1キロ粒 剤	○	○	○	多年生広葉雑草											移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・移植3日後以降の使用を推奨する。
33・27・ 2	シクロピリモレー ト・ピラゾレート・ プロピリスルフロ ン	ウルティモZ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											移植直後～ノビエ3.5 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	
27・14・ 2	テフリルトリオン・ ピラクロニル・ブ ロピリスルフロ ン	アットウZ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											移植直後～ノビエ4 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・ノビエ2.5葉期までの使用を推奨する。 ・砂壤土ではノビエ2.0葉期までの使用を推奨する。
2・14・ 27	トリアファモン・ピ ラクロニル・ベン ゾピシクロン	アシュラフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	・早期栽培、砂壤土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。 ・後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2・14・ 27	トリアファモン・ピ ラクロニル・ベン ゾピシクロン	アシュラ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	・早期栽培、砂壤土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。 ・後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2・14・ 27	トリアファモン・ピ ラクロニル・ベン ゾピシクロン	アシュラジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・後作物となす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 ・早期栽培ではノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。
2・14・ 27	トリアファモン・ピ ラクロニル・ベン ゾピシクロン	アシュラ400FG(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
15・2・ 27	フェントラザミド・ ベンスルフロメ チル・ベンゾピシ クロン	クサトリ-BSXジャンボL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後1日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	
14・27・ 27	ピラクロニル・ピ ラゾレート・ベン ゾピシクロン	イネキングジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後1日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	
33・27・ 2	シクロピリモレー ト・トリアファモ ン・ピラゾレート	ジャスタジャンボ クサウェボンジャンボ	○	○	○	多年生雑草											移植後1日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・後作物となす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
15・27・ 2	フェントラザミド・ ベンゾピシクロ ン・メタゾスル フロ	天空ジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後1日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・移植3日後以降の使用を推奨する。
15・27・ 2	フェントラザミド・ ベンゾピシクロ ン・メタゾスル フロ	天空エアー粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後1日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	・移植3日後以降の使用を推奨する。
27・27・ 2	ピラゾレート・ベン ゾピシクロン・ メタゾスルフロ	アールタイプフロアブル シュナイデンフロアブル	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○	○		○	・早期栽培では薬害の恐れがあるので使用を避ける。
27・27・ 2	ピラゾレート・ベン ゾピシクロン・ メタゾスルフロ	アールタイプジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	
2・15	ピリミスルファン・ フェノキサスル ホン	ガンガンジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	
2・15	ピリミスルファン・ フェノキサスル ホン	ガンガン豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○	○	○	○	
15・0・ 2・27	カフェンストロー ル・ダイムロン・ ベンスルフロメ チル・ベンゾピシ クロン	シロノックLフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)		○		○	
15・0・ 2・27	カフェンストロー ル・ダイムロン・ ベンスルフロメ チル・ベンゾピシ クロン	シロノックLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	移植後3日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	
2・15・ 27	ピリミスルファン・ フェノキサスル ホン・フェンキノ トリオン	ベッカクジャンボ	○	○	○	多年生雑草											移植3日後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	
2・15・ 27	ピリミスルファン・ フェノキサスル ホン・フェンキノ トリオン	ベッカク豆つぶ250	○	○	○	多年生雑草											移植3日後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○	○	○	

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生			多年生										薬 類・ 表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに 使用可	備 考
			ノ ビ エ	一 年 生 イ ネ 科 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	マ ツ バ イ	ホ タ ル イ	ウ リ カ ワ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	ク ロ グ ワ イ	オ モ ダ カ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	コ ウ キ ヤ ガ ラ	多 年 生 イ ネ 科 雑 草	キ シュ ウ ス ズ メ ノ ビ エ		無 人 航 空 機	水 口 施 用	湛 水 周 縁 散 布		
14・2・0	ピラクロニル・プロピリスルフロ ン・プロモブチド	アッパレZ400FG	○	○	○											○	移植3日後～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○		○	○	
27・14・ 2	フェンキノトリオ ン・ペントキサゾ ン・メタゾスルフ ロン	流星ジャンボ	○	○	○												移植3日～ノビエ3葉 期(但し、移植後30日 まで)				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
14・2・0	ピラクロニル・プロ ピリスルフロ ン・プロモブチド	アッパレZジャンボ	○	○	○											○	移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	
0・27・2	オキサジクロメホ ン・テフリルトリオ ン・メタゾスルフ ロン	ディオーレフロアブル	○	○	○												移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
0・27・2	オキサジクロメホ ン・テフリルトリオ ン・メタゾスルフ ロン	ディオーレジャンボ	○	○	○												移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
15・27・ 2	イブフェンカルバ ゾン・テフリルトリ オン・プロピリス ルフロ ン	カイリキZジャンボ	○	○	○												移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)		○		○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
27・14・ 2	フェンキノトリオ ン・ペントキサゾ ン・メタゾスルフ ロン	流星フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植3日～ノビエ3葉 期(但し、移植後30日 まで)	○			○	・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
14・2・0	ピラクロニル・プロ ピリスルフロ ン・プロモブチド	アッパレZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)		○		○	
15・0・2	カフェンストロー ル・ダイムロン・メ タゾスルフロ ン	月光フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	
15・0・2	カフェンストロー ル・ダイムロン・メ タゾスルフロ ン	月光ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)				○	
27・2	テフリルトリオ ン・プロピリスルフロ ン	ガツントZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
2・2・ 15・27	ピラゾスルフロ ンエチル・ピリフ タリド・プレチラク ロール・メソトリ オン	アピログロウMXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後3日～ノビエ3 葉期(但し、移植後30 日まで)	○			○	
0・27・ 2・0	オキサジクロメホ ン・フェンキノトリ オン・プロピリス ルフロ ン・プロモ ブチド	シンズイズ豆つぶ250	○	○	○												移植後3日～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○	○	○	○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
2・2・27	ピリフタリド・ピ リスルファン・メソ トリオン	ジャンダルムMXジャンボ	○	○	○												移植3日後～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	
2・2・27	ピリフタリド・ピ リスルファン・メソ トリオン	ジャンダルムMX豆つぶ 250	○	○	○												移植3日後～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○		○	○	
0・27・ 2・0	オキサジクロメホ ン・フェンキノトリ オン・プロピリス ルフロ ン・プロモ ブチド	シンズイズジャンボ	○	○	○												移植後3日～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
27・2	テフリルトリオ ン・プロピリスルフロ ン	ガツントZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後3日～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後60日まで)	○			○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
27・2	テフリルトリオ ン・プロピリスルフロ ン	ガツントZ200FG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後3日～ノビエ 3.5葉期(但し、移植 後60日まで)	○		○	○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
27・14・ 2	テフリルトリオ ン・ピラクロニル・プロ ピリスルフロ ン	アットウZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後3日～ノビエ4 葉期(但し、移植後30 日まで)	○	○		○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
27・14・ 2	テフリルトリオ ン・ピラクロニル・プロ ピリスルフロ ン	アットウZジャンボ	○	○	○												移植後3日～ノビエ4 葉期(但し、移植後60 日まで)	○			○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を 避ける。
27・14・ 2	テフリルトリオ ン・ピラクロニル・メ タゾスルフロ ン	コメツジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後5日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)				○	
15・4・2	インダノファン・ク ロメプロップ・ベン スルフロ ンメチ ル	マサカリLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後5日～ノビエ 2.5葉期(但し、移植 後30日まで)	○			○	・移植後早い時期の処理で、高温が続く場合には一過性の 生育抑制が発生する場合がある。

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										使用時期	他の使用方法			備考		
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ		多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ	無人航空機		水口施用	湛水周縁散布
33・27・2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロ	ウルティモZフロアブル	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植後5日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○	・砂壤土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
33・27・2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロ	ウルティモZジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後5日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)			○	・早期栽培、砂壤土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
0・14・2	ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロ	銀河フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植後5日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで)			○	
0・14・2	ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロ	銀河ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後5日～ノビエ3葉期(但し、収穫60日前まで)			○	・コウキヤガラは草丈30cmまでの散布で、除草効果が高い。
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンブリーフロアブル ボデーガードフロフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後5日～ノビエ3.5葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○	・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンブリージャンボ ボデーガードプロジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後5日～ノビエ3.5葉期(但し、移植後30日まで)			○	・ノビエ3葉期までの使用を推奨する。 ③後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2・27	プロピリスルフロ ・ランコトリオン ナトリウム塩	フルスコアZ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植後5日～ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前まで	○			
2・27	プロピリスルフロ ・ランコトリオン ナトリウム塩	フルスコアZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植後5日～ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日前まで				・砂壤土水田や早期水稲ではノビエ3葉期までの使用を推奨する。
15・14・2・27	カフェンストール・カルフェントラゾンエチル・フルセツスルフロ ・ベンゾピシクロ	フルイニングジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後5日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)			○	・ノビエ3葉期を過ぎての処理では、他の雑草が殺草年齢限界を超える場合があるので、雑草の発生消長と葉齢を確認しながら散布する。
27・2・4	テフリルトリオン・トリアファモン・フルピラウキシフェンベンジル	ストレングス1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植後5日～ノビエ4葉期(但し、移植後30日まで)	○		○	・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
4・2・27	フルピラウキシフェンベンシル・ベノキスラム・ベンゾピシクロ	ウィードコア1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○	・移植後15日までの使用を推奨する。 ・早期栽培、砂壤土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27・2	ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロ	アクシズMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○		○	・ウリカワ多発田では効果の高い薬剤との体系処理が望ましい。
2・2・27	アジムスルフロ ・ベノキスラム・メソトリオン	アトカラSジャンボMX セカンドショットSジャンボMX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植後14日～ノビエ3.5葉期(但し、収穫45日前まで)				
0・14・27・2	ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾピシクロ ・メタゾスルフロ	ゲバード1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後14日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○	
0・14・27・2	ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾピシクロ ・メタゾスルフロ	ゲバードジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後14日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)			○	
0・14・27・2	ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾピシクロ ・メタゾスルフロ	ゲバードエアー粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後14日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○	○	○	
2	ピリミスルファン	アトトリ1キロ粒剤	○			多年生広葉雑草											移植後14日(イ45葉期以降)～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○		○	
2	ピリミスルファン	アトトリ豆つぶ250	○			多年生広葉雑草											移植後14日(イ45葉期以降)～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○		○	
5・0・27・2	ジメタメリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロ	レプラスジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後14日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)			○	
5・0・27・2	シメタメリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロ	レプラスエアー粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											移植後14日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○	○	○	
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキントリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草										○	移植後14日(稲5葉期以降)～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)			○	・高温条件では薬害を生ずることがある。

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生			多年生											薬 類・ 表層剥離	使用時期	他の使用方法			備 考
			ノ ビ エ	一 年 生 イ ネ 科 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	マ ツ バ イ	ホ タ ル イ	ウ リ カ ワ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	ク ロ グ ワ イ	オ モ ダ カ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	コ ウ キ ヤ ガ ラ	多 年 生 イ ネ 科 雑 草	キ シュ ウ ス ズ メ ノ ビ エ			無 人 航 空 機	水 口 施 用	湛 水 周 縁 散 布	
5・2・27	ジメタメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン	ツイゲキ豆つぶ250	○	○	○												○	移植後14日(稲5葉期以降)～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
5・0・27・2	シメタメトリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	レプラス1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後14日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○	
1	メタミホップ	トドMF1キロ粒剤	○													○		移植後14日～ノビエ5葉期まで(但し、収穫50日前まで)	○		○	
1	メタミホップ	トドMF乳剤	○													○		移植後14日～ノビエ7葉期まで(但し、収穫50日前まで)			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
33・27	シクロピリモレート・テフリルトリオン	バイスコープ1キロ粒剤 ルナクロス1キロ粒剤		○	○		○	○	○	○	○							移植後14日～60日(但し、収穫45日前まで)	○			・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
1・5・2・27	シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロン・メチル・ベンゾビシクロン	ハイクット1キロ粒剤 サンパンチ1キロ粒剤	○	○	○											○	○	移植後15日～ノビエ3.5葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○	・体系処理の後処理剤として使用する。 ・クログワイ、オモダカ対策の体系処理剤として有効
2・27	ペノキスラム・ベンゾビシクロン	テッケン1キロ粒剤 ニトウリュウ1キロ粒剤	○	○	○													移植後15日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○	
2・27	ペノキスラム・ベンゾビシクロン	テッケンジャンボ ニトウリュウジャンボ	○	○	○													移植後15日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)			○	
27・2	テフリルトリオン・ペノキスラム	ワイドショット1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後15日～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○			
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○															移植後15日～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○		○	・ノビエの2葉期から4葉期が使用適期 ・処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ・移植前後の初期除草剤との体系で使用する。
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン豆つぶ250	○															移植後15日～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○	○	○	
2・6	ピリミノバックメチル・ベンタゾン粒	ヒエクリーンバサグラン粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○							移植後15日～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)			○	・ノビエの2葉期から4葉期が使用適期 ・ピリミノバックメチルは湛水が必要だが、ベンタゾンは水溶性が高いため確実に止水する(水口・水尻をしっかりと止める)。深水にすると効果が落ちる。 ・散布後7日間は落水、かけ流しをしない。 ・散布後2日以内の降雨で効果が十分に得られない場合があるので、天候に注意する。 ・漏水田などでは使用しない。
0・2	ダイムロン・ペノキスラム	ワイドアタックD1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後15日～ノビエ5葉期(イネ4葉期以降)(但し、収穫60日前まで)	○		○	・初期剤、一発処理剤との体系で使用する。 ・落水することなく、湛水状態のままに散布する。
6	ベンタゾンナトリウム塩	バサグラン液剤(ナトリウム塩)			○	○	○	○	○	○	○			○				移植後15～55日(但し、収穫50日前まで) 移植後15日～収穫45日前まで			○	・落水又は極浅水(雑草が水面上)にして散布し、散布後3～4日は入水、落水はしない。 ・処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になる。 ・ベンタゾンの薬害注意、DCPA剤との近接散布は避ける。
2	ペノキスラム	ワイドアタックSC	○	○	○													移植後20日(イネ5葉期以降)～ノビエ6葉期(但し、収穫30日前まで)			○	・前処理剤との体系で使用する。 ・展着剤は加用しない。 ・散布後2日間は入水、落水、かけ流しはしない。 ・イネ「クサ、ヒメソハギ、アゼガヤ、チウジタテ」等には効果が低い。
1	シハロホップブチル	クリンチャー1キロ粒剤	○													○		①移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫30日前まで) ②移植後25日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)	○		○	・処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ・アゼガヤに適用あり、草丈20cmまでに散布する。
1	シハロホップブチル	クリンチャージャンボ	○													○		①移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫30日前まで) ②移植後25日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)			○	・アゼガヤに適用あり、草丈20cmまでに散布する。
1・6	シハロホップブチル・ベンタゾン	クリンチャーバSME液剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		移植後15日～ノビエ5葉期(但し、収穫50日前まで)			○	

除草1-1移植水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生			多年生										藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			備考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシユウスズメノヒエ		無人航空機	水口施用	湛水周縁散布	
6・1	ペンタゾン・メタミホップ	トドメバスMF液剤	○	○	○												移植後15日～ノビエ6葉期まで(但し、収穫50日前まで)				○ ・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
1	シハロホップブチル	クリンチャーEW	○													○	移植後20日～ノビエ6葉期(但し、収穫30日前まで)				○ ・散布薬液は使用当日に調製し、展着剤を加用する。 ・アゼガヤに適用あり、草丈60cmまでに散布する。
4	フロルピラウキンフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○		○	○		○	○		○	○					移植後20日～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで)				○ ・幼穂形成期以降の散布では葉先の黄化や止葉の下垂が生じることがある。 ・いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがある。
2・2	ハロスルフロンメチル・メタゾスルフロン	アレイルSC	○	○	○												移植後20日～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで) ※出穂始期15日前まで				○ ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
4	2, 4-PA	粒状水中2, 4-D															有効分げつ終止期～幼穂形成期前(但し、収穫60日前まで)				・雑草が水面下にかくれるくらいまでに湛水して散布し、散布後2～3日は落水しない。
0	ACN	モゲトン粒剤						○								○	雑草種により使用時期が異なる	○	○		○ ・極端な砂質土(漏水田)では使用しない。 ・極端な深水で使用すると薬害を生ずることがある。 ・ウキクサ類に適用あり。 ・水口施用は藻類・表層剥離で適用。
2	ビスピリバクナトリウム塩	ノミニー液剤															移植後30日～クサネムの草丈40cmまで 移植後30日～イボクサの茎長30cmまで(但し、収穫60日前まで)				○ ・茎葉処理剤。 ・湛水状態またはごく浅水状態にして、雑草の茎葉全体に薬剤が付着するようにする。 ・3日以上落水(浅水)状態を保つ。 ・クサネムとイボクサ対策に使用。 ・クサネムは再生する場合があるが着莢が減少する。 ・イボクサは本田内で再生し、伸長を始めた時期に散布する。