

除草1-2.直播水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生												使用時期	WCS 用イネに 使用可	備 考
			ノ ビ エ	一 年 生 イ ネ 科 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	マ ツ バ イ	ホ タ ル イ	ウ リ カ ワ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	ク ロ グ ワ イ	オ モ ダ カ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	コ ウ キ ヤ ガ ラ	多 年 生 イ ネ 科 雑 草	キ シ ユ ウ ス ズ メ ノ ヒ エ			

は種前施用

9	グリホサートカリウム塩	ラウンドアップマックスロード	○	○	○												①耕起前(雑草生育期) ②は種30日前～出芽前 (雑草生育期)(乾田不 耕起栽培) ③耕起直後～出芽前 (雑草生育期)(乾田耕 起栽培)	○	
9	グリホサートイソプロピ ルアミン塩	草枯らし	○	○	○												①耕起20～10日前(雑 草生育期)1年生雑草の み ②耕起直後～出芽前 (雑草生育期)(乾田耕 起栽培) ③は種30日前～出芽前 (雑草生育期)(乾田不 耕起栽培)	○	・雑草茎葉散布
9	グリホサートカリウム塩	タッチダウンiQ	○	○	○												①耕起前(雑草生育期) ②播種30日前～出芽前 (雑草生育期)(乾田不 耕起栽培)	○	・汎用除草剤の項参照
9・14	グリホサートイソプロピ ルアミン塩・ピラフル フェンエチル	サンダーボルト007	○	○	○												耕起20～10日前(雑草 生育期)		
22・22	ジクワット・パラコート	ブリグロックスL(毒)	○	○	○												秋期稲刈取後又は春期 水田耕起1ヶ月前から直 前まで又は雑草生育 期、播種前14日～播種 後7日(稲出芽前)	○	
27・27	ピラゾキシフェン・ベン ゾビシクロン	ブレキープ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○				湛水直播の代かき後～ は種7日前又はは種直 後～ノビエ1葉期(但し、 収穫90日前まで)	○	・湛水散布又は無人航空機による散布

は種時施用(は種同時散布機で施用)

2・27	ピリミノバックメチル・ フェンキトリオン	ペルーガ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	は種時	○	
2・2・ 27	イマズスルフロリン・ピリ ミノバックメチル・フェン キトリオン	マスラオ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	は種時	○	
27・ 27・2	ピラゾレート、ベンゾビ シクロン、メタゾスルフ ロン	ジカマック500グラム粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種時	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・27	トリアファモン・フェンキ トリオン	ブライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種時	○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・2	テフリルトリオン・トリア ファモン	カウンスルコンプリート1キ ロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒 剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種時	○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎおよびさやえんどうを栽培しない。
27・27	ピラゾキシフェン・ベン ゾビシクロン	ブレキープ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○					は種時	○	
33・2・27	シクロピリモレート・トリ アファモン・ピラゾレー ト	ジャスタ1キロ粒剤 クサウエボン1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○					は種時		・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
27	ピラゾレート	サンバード粒剤	○	○	○	○	○	○										は種時	○	・散布後5日間以上できるだけ長く、湛水状態を維持し、田面を露出させたり、水をきらしたりしないよう注意し、かけ流しや落水をさける。 ・湛水直播で落水出芽法をとる場合は、使用しない。
27	ピラゾレート	サンバード1キロ粒剤30	○	○	○	○	○	○										は種時	○	・キカシグサ、ヒメミソハギなど1年生広葉雑草に効果が不十分な場合があり、多発田では後期除草剤との体系で使用する。
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○															は種時	○	・散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。
2・27	ピリフタリド・ベンゾビシ クロン	アビロファースト1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○									湛水直播のは種時		