

除草1-2.直播水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										薬 類・表 層剥離	使用時期	他の使用方法			WGS 用イネに 使用可	備 考
			ノ ビ エ	一 年 生 イ ネ 科 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	マ ツ バ イ	ホ タ ル イ	ウ リ カ ワ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	ク ロ グ ワ イ	オ モ ダ カ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	コ ウ キ ヤ ガ ラ	多 年 生 イ ネ 科 雑 草	キ シ ュ ウ ス ズ メ ノ ビ エ					

播種後施用

5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキントリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			稲5葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○			
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキントリオン	ツイゲキ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			稲5葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○			
5・2・27	シメトリン・テフルトリオン・トリアファモン・ベンザロート	ノックアウト楽粒	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	稲1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			
1・4	シバロホウフオチル・フロルピラウキシフェンベンジル	ノブレクト乳剤	○	○	○			○	○			○					稲3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで)				
2・27	ピリフタリド・ベンゾピシクロン	アピロファースト1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○								湛水直播のは種直後～ノビエ1.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			
27	ピラゾレート	サンバード粒剤	○	○	○	○	○	○									は種直後～ノビエ1葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○	・散布後5日間以上できるだけ長く、湛水状態を維持し、田面を露出させたり、水をきらしたりしないよう注意し、かけ流しや落水をさける。 ・湛水直播で落水出芽法をとる場合は、使用しない。 ・キカシグサなど1年生広葉雑草に効果が不十分な場合があり、多発田では後期除草剤との体系で使用する。
27	ピラゾレート	サンバード1キロ粒剤30	○	○	○	○	○	○									湛水直播のは種直後～ノビエ1葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○	・散布後5日間以上できるだけ長く、湛水状態を維持し、田面を露出させたり、水をきらしたりしないよう注意し、かけ流しや落水をさける。 ・湛水直播で落水出芽法をとる場合は、使用しない。 ・ヒメミソハギなど1年生広葉雑草に効果が不十分な場合があり、多発田では後期除草剤との体系で使用する。
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○														は種直後～稲出芽前			○	・ノビエの発生前～4葉期まで有効なので時期を失しないように散布する。 ・散布後数日間暑しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。 ・落水後、土壌が落ち着いたら散布する。
15	ベンチオカーブ	サターン乳剤	○	○	○	○											①は種直後～稲出芽前(入水15日前まで) ②稲出芽前期～ノビエ1.5葉期(但し、収穫90日前まで)(入水15日前まで)				
27・27・2	ピラゾレート・ベンゾピシクロン・メタゾスルフロン	ジカマック500グラム粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				は種直後～ノビエ1.5葉期まで(但し、収穫90日前まで)	○		○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・14・0	イマゾスルフロン・ピラクロニル・プロモブチド	パッチリ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ出芽始期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○	・出芽以降の使用を推奨する。
2・2・27	イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	マスラオ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)			○	
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	ペルーガ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)			○	
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	ペルーガフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○				は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・イネ1葉期～ノビエ3葉期までの使用を推奨する。
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	ペルーガジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ出芽前期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	ペルーガ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ出芽前期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)	○		○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	エンペラー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○								イネ出芽前期～ノビエ3葉期(但し、収穫60日前まで)			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	エンペラーフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ出芽前期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる可能性があるため、稲1葉期～ノビエ3葉期までの使用を推奨する。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	エンペラージャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	イネ出芽前期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキントリオン	エンペラー豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	イネ出芽前期～ノビエ3葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27	トリアファモン・フェンキントリオン	ブライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				は種直後～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。

除草1-2.直播水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生			多年生										薬 類・ 表層 刺戟	使用時期	他の使用方法			WG S用 イネに 使用可	備 考
			ノ ビ エ	一 年 生 イ ネ 科 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	マ ツ バ イ	ホ タ ル イ	ウ リ カ ワ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	ク ロ グ ワ イ	オ モ ダ カ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	コ ウ キ ヤ ガ ラ	多 年 生 イ ネ 科 雑 草	キ シ ュ ウ ス ズ メ ノ ビ エ		無 人 航 空 機	水 口 施 用	湛 水 周 縁 散 布		
2・27	トリアファモン・フェンキ ノトリオン	ブライオリティジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ出芽前期～ノビエ 3.5葉期(但し、収穫90日 前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27	トリアファモン・フェンキ ノトリオン	ブライオリティ豆つば25 0	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ出芽前期～ノビエ 3.5葉期(但し、収穫90日 前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・2	デフリルトリオン・トリア ファモン	カウンシルコンプリート1 キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ 粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				は種直後～ノビエ3.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培 しない。
27・2	デフリルトリオン・トリア ファモン	カウンシルコンプリートフ ロアブル ボデーガードフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○					は種直後～ノビエ3.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○	○		○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培 しない。
27・2	デフリルトリオン・トリア ファモン	カウンシルコンプリート ジャンボ ボデーガードプロジャン ボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培 しない。
14・0・ 2・0	イマゾスルフロン・オキ サジクロメホン・プロモ ブチド・ピラクロニル	サラブレッドGO1キロ粒 剤(管)	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○				・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。
14・0・ 2・0	イマゾスルフロン・オキ サジクロメホン・プロモ ブチド・ピラクロニル	サラブレッドGOフロアブ ル(管)	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○	○			・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
14・0・ 2・0	イマゾスルフロン・オキ サジクロメホン・プロモ ブチド・ピラクロニル	サラブレッドGOジャンボ (管)	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)					・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
14・0・ 2・0	イマゾスルフロン・オキ サジクロメホン・プロモ ブチド・ピラクロニル	サラブレッド GO400FG(管)	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○		○		・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・0・ 14・0	イマゾスルフロン・オキ サジクロメホン・ピラク ロニル・プロモブチド	パッチリLX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○			○	
2・0・ 14・0	イマゾスルフロン・オキ サジクロメホン・ピラク ロニル・プロモブチド	パッチリLXフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○			○	
15・2・ 27	イブフェンカルバゾン・ イマゾスルフロン・ベン ゾビシクロン	ツルギジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・2・ 27	イブフェンカルバゾン・ イマゾスルフロン・ベン ゾビシクロン	ツルギ250粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日まで)	○	○		○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
4・27・ 15	クロメブロップ・テフリ ルトリオン・フェントラザ ミド	イネリーグ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。
4・27・ 15	クロメブロップ・テフリ ルトリオン・フェントラザ ミド	イネリーグフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。
0・15・ 27・2	ダイムロン・フェノキサ スルホン・フェンキノ トリオン・ペンシルフロ ンメチル	ラオウ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・15・ 27・2	ダイムロン・フェノキサ スルホン・フェンキノ トリオン・ペンシルフロ ンメチル	ラオウジャンボ	○	○	○		○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)				○	
0・15・ 27・2	ダイムロン・フェノキサ スルホン・フェンキノ トリオン・ペンシルフロ ンメチル	ラオウフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
33・ 27・2	シクロピリモレート・ビ ラゾレート・プロピリス ルフロン	ウルティモZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を 避ける。
15・0・ 2・27	カフェンストロール・ダ イムロン・ペンシルフロ ンメチル・ベンゾビシク ロン	シロノックLフロアブル	○	○	○	○	○	○	○								イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・0・ 2・27	カフェンストロール・ダ イムロン・ペンシルフロ ンメチル・ベンゾビシク ロン	シロノックLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○								イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日前ま で)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・2・ 27	イブフェンカルバゾン・ イマゾスルフロン・ベン ゾビシクロン	ツルギフロアブル	○	○	○	○	○	○	○								イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・0・ 14・0	イマゾスルフロン・オキ サジクロメホン・ピラク ロニル・プロモブチド	パッチリLX400FG	○	○	○	○	○	○	○			○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉 期(但し、収穫90日まで)	○		○	○	

除草1-2.直播水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備 考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ			多年生イネ科雑草	キシユウスズメノヒエ	無人航空機		
27・14・2	テフリルトリオン・ピラクロニル・プロピリスルフロン	アットウZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)	○		○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。	
27・2	テフリルトリオン・プロピリスルフロン	ガソントZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫60日前まで)	○		○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。	

除草1-2.直播水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										薬類・表層刺殺 キシウスズメノヒエ	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネに使用可	備 考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
27・2	テフリトリオン・プロピリスルフロ	ガツントZフロアブル	○	○	○	○	○	○			○	○			○	イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)	○	○		○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・2	テフリトリオン・プロピリスルフロ	ガツントZジャンボ	○	○	○	○	○	○			○	○			○	イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫60日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・2	テフリトリオン・プロピリスルフロ	ガツントZ200FG	○	○	○	○	○	○			○	○			○	イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫60日前まで)	○		○	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・27・2	フェノキサスルホン・フェンキトリオン・メタゾスルフロ	アカツキ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫60日前まで)					・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・27・2	フェノキサスルホン・フェンキトリオン・メタゾスルフロ	アカツキジャンボ	○	○	○		○	○	○			○	○			イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫60日前まで)					・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
15・27・2	フェノキサスルホン・フェンキトリオン・メタゾスルフロ	アカツキ豆つぶ250	○	○	○		○	○	○			○	○			イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫60日前まで)	○				・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・15・27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキトリオン	ベッカク1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫75日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・15・27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキトリオン	ベッカクジャンボ	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫75日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・15・27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキトリオン	ベッカク豆つぶ250	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫75日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27・15	トリアファモン・フェンキトリオン・フェントラザミド	カウントダウン1キロ粒剤 カウンシルエナジー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3.5葉期 (但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・27・15	トリアファモン・フェンキトリオン・フェントラザミド	カウントダウンジャンボ カウンシルエナジージャンボ	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3.5葉期 (但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・2・15・27	ピラゾスルフロエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・2・15・27	ピラゾスルフロエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMXジャンボ	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・27・2	フェントラザミド・ベンゾビシロン・メタゾスルフロ	天空エアー粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)	○		○	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリトリオン・メタゾスルフロ	ディオーレ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリトリオン・メタゾスルフロ	ディオーレフロアブル	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリトリオン・メタゾスルフロ	ディオーレジャンボ	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
14・2・0	ピラクロニル・プロピリスルフロ・プロモブチド	アツパレZ400FG	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)	○		○	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・14・2	フェンキトリオン・ベントキサゾン・メタゾスルフロ	流星1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・14・2	フェンキトリオン・ベントキサゾン・メタゾスルフロ	流星フロアブル	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・14・2	フェンキトリオン・ベントキサゾン・メタゾスルフロ	流星ジャンボ	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
4・27・15	クロメブロップ・テフリトリオン・フェントラザミド	イネリーグジャンボ	○	○	○	○	○	○			○	○				イネ1葉期～ノビエ3葉期 (但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。

除草1-2.直播水稻除草剤

HRAC コード	成分名	商品名	一年生			多年生										薬 類・ 表層 刺戟	使用時期	他の使用方法			WGS 用イネに 使用可	備 考											
			ノ ビ エ	一 年 生 イ ネ 科 雑 草	一 年 生 広 葉 雑 草	マ ツ バ イ	ホ タ ル イ	ウ リ カ ワ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	ク ロ グ ワ イ	オ モ ダ カ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	コ ウ キ ヤ ガ ラ	多 年 生 イ ネ 科 雑 草			キ シ ュ ウ ス ズ メ ノ ビ エ	無 人 航 空 機	水 口 施 用			湛 水 周 縁 散 布										
2・2・27	ビリフタリド・ビリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○				○	○																	○		
2・2・27	ビリフタリド・ビリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMX豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○				○	○													○			○	○		
2・27・15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンフロアブル カウンシルエナジーフロアブル	○	○	○		○	○	○				○	○													○					○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロロン・プロモブチド	シンズイズ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○	○																	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。	
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロロン・プロモブチド	シンズイズフロアブル	○	○	○	○	○	○	○				○	○																	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。	
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロロン・プロモブチド	シンズイズジャンボ	○	○	○		○	○	○				○	○																	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。	
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロロン・プロモブチド	シンズイズ豆つぶ250	○	○	○		○	○	○				○	○													○					○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
33・2・27	シクロビリモレート・トリアファモン・ピラゾレート	ジャスタジャンボ クサウェボンジャンボ	○	○	○	○	○	○	○				○	○																	○	・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。	
33・2・27	シクロビリモレート・トリアファモン・ピラゾレート	ジャスタフロアブル クサウェボンフロアブル	○	○	○	○	○	○	○					○				○									○	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。	
33・2・27	シクロビリモレート・トリアファモン・ピラゾレート	ジャスタ1キロ粒剤 クサウェボン1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○					○													○					○	・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
33・27・2	シクロビリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロロン	ウルティモZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○					○																		○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土ではイネ2葉期以降の使用を推奨する。
33・27・2	シクロビリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロロン	ウルティモZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○					○													○					○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土ではイネ3葉期以降の使用を推奨する。
2・27・2	ビリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロロン	アクシズMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○				○	○													○					○	
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン	アシュラフロアブル(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○	○					・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン	アシュラ1キロ粒剤(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													○						・稲1葉期～ノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン	アシュラジャンボ(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・イネ1葉期～ノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾピシクロン	アシュラ400FG(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																			・稲1葉期～ノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。
27・2・4	テフリルトリオン・トリアファモン・フロルピラウキシフェンベンジル	ストレングス1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○	○													○					○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2	プロピリスルフロロン・ランコトリオンナトリウム塩	フルスコアZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○	○													○						・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2	プロピリスルフロロン・ランコトリオンナトリウム塩	フルスコアZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○					○	○																		・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2	ビリミノバックメチル	ヒエクリーン豆つぶ250	○																								○					○	・稲の根が露出している条件では薬害を生ずる場合がある。
1・5・2・27	シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロンメチル・ベンゾピシクロン	ハイカット1キロ粒剤 サンバンチ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○														○					○	・初期剤、一発処理剤との体系で使用する。 ・稲の根が露出している条件では薬害を生ずる場合がある。
4・2・27	フロルピラウキシフェンベンジル・ペノキススラム・ベンゾピシクロン	ウィードコア1キロ粒剤	○	○	○		○	○	○				○	○													○					○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2	ペノキススラム	ワイドアタックSC	○	○	○	○	○	○	○					○	○																	○	・前処理剤との体系で使用する。 ・展着剤は加用しない。 ・散布後2日間は入水、落水、かけ流しはしない。 ・イネクサ、ヒメシハギ、アセカヤ、チョウジタデ等には効果が低い。

HRAC コード	成分名	商品名	一年生		多年生										薬 類・表 層制 雑	使用時期	他の使用方法			WCS 用イネ に使用 可	備 考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ			多年生イネ科雑草	キシユウスズメノヒエ	無人航空機		
4	フロルピラウキシフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○		○					○	○								○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。	
0・2	ダイムロン・ペノキスラム	ワイドアタックD1キロ粒剤	○	○	○	○					○	○						○			
33・27	シクロピリモレート・テフルトリオン	ルナクロス1キロ粒剤		○	○				○	○	○							○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。		
1	メタミホップ	トドメF1キロ粒剤	○															○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。		
27・2	テフルトリオン・ペノキスラム	ワイドショット1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○			○	○						○			
2・27	ペノキスラム・ベンジビシクロン	テッケン1キロ粒剤 ニトウリュウ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○				○						○			
2・27	ペノキスラム・ベンジビシクロン	テッケンジャンボ ニトウリュウジャンボ	○	○	○	○	○	○				○	○		○			○			
2・2・27	アジスルフロン・ペノキスラム・メソトリオン	アトカラSジャンボMX セカンドショットSジャンボMX	○	○	○	○	○	○				○	○								
2・2	ハロスルフロンメチル・メタソルフロン	アレイルSC	○	○	○			○	○			○	○						・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。		
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキネトリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。		
2	ピリミスルファン	アトトリ1キロ粒剤									○	○						○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。		
2	ピリミスルファン	アトトリ豆つぶ250									○	○						○			
1	シハロホップブチル	クリンチャー1キロ粒剤	○															○	・処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。		
1	シハロホップブチル	クリンチャージャンボ	○															○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。		
1	シハロホップブチル	クリンチャーEW		○														○	・落水状態で散布する。 ・広葉雑草が多い場合には、有効な剤と組み合わせて使用する。		
1・6	シハロホップブチル・ペンタゾンナトリウム塩	クリンチャーバスメ液剤	○	○	○	○	○	○	○									○	・散布液は使用当日に調製する。 ・重複散布を避ける。 ・高温が予想される時の使用は避ける。 ・展着剤は加用しない。 ・他剤とは混用しない。DCPA剤との近接散布は避ける。 ・効果が現れるまで10～14日要するので、誤まって散布直しをしない。		
6・1	ペンタゾン・メタミホップ	トドメバSMF液剤	○	○	○	○	○	○										○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。		
1	メタミホップ	トドメF乳剤	○															○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。		
6	ペンタゾンナトリウム塩	バサグラン液剤(ナトリウム塩)			○	○	○	○	○	○								○	・は種後35～50日(但し、収穫50日前まで) ・は種後35日～収穫45日前まで		