

作物1－1. 稲: 苗防除剤

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病	こま葉枯病	ばか苗病	もみ枯細菌病	褐条病	苗立枯細菌病	苗立枯細菌病(トリコデルマ)	苗立枯細菌病(フザリウム)	苗立枯細菌病(リゾクトニア)	苗立枯細菌病(白絹病)	苗立枯細菌病(アルタナリア)	イネシンガレンセンチュウ	高密度は種に対応	WCS用稲に使用可	備考
--------	--------	-----	-----	------	-------	------	--------	-----	--------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------	--------------	----------	-----------	----

1. 種子処理(浸漬、粉衣、塗抹等)

BM02		トリコデルマ・アトロピリデ	エコホープDJ	○	○	○	○	○			○						○	ー
		タロマイセスフラバス	タフブロック	○		○	○	○	○	○	○						○	・健全な種もみを使用する。 ・TPN剤(ダコレートなど)、ペノミル剤(ベンレートなど)による土壌消毒は実施しない。
不明		パチルス・シンプレクス	モミホープ水和剤				○		○								○	ー
		醸造酢	エコフィット				○	○	○								○	ー
313		オキシリニック酸・プロクロラズ	スポルタックスターナSE	○	○	○	○	○	○								○	スターナ剤耐性イネもみ枯細菌病菌の発生が確認されており、過去防除効果が劣った場合は他剤に変更する。
3M01		イブコナゾール・銅	テクリードCフロアブル	○	○	○	○	○	○		○						○	ー
M031		チウラム・ペノミル	ベンレートT水和剤20	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	ー
	1B	MEP	スミチオン乳剤												○		○	ー

2. 培土処理(灌注等)

BM02		タロマイセスフラバス	タフブロック								○						○	・クリーンな培土を使用する。 ・TPN剤(ダコレートなど)、ペノミル剤(ベンレートなど)による土壌消毒は実施しない。
1		ペノミル	ベンレート水和剤	○					○	○							○	ー
16.1		トリシクラゾール	ビームゾル(劇)	○														ー
U17		ピカルブトラゾクス	ナエファイン粉剤							○	○	○					○	育苗箱土壌に均一に混和する。ムレ苗防止
U17		ピカルブトラゾクス	ナエファインフロアブル							○	○	○					○	ムレ苗防止
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5									○	○					ー
32		ヒドロキシイソキサゾール	タチガレン液剤		○					○	○						○	施用量が多すぎた場合、初期生育が抑制されることがある。
M05		TPN	ダコニール1000								○						○	ー
324		ヒドロキシイソキサゾール・メタラキシルM	タチガレエースM液剤							○	○						○	ー
P03	ー	オキサゾスルフィル・イソチアニル	稲名人箱粒剤						○						○		○	ー
P037	ー	オキサゾスルフィル・イソチアニル・インピルフルキサム	稲大將箱粒剤						○						○		○	ー

【種子処理剤の魚毒、薬害に対する注意】

- ①魚介類に影響を及ぼすおそれがあるので、残液や廃液を河川、湖沼、ため池及びこれらに流入するおそれがある場所には絶対捨てない。
 ②軽度の生育遅延を認めることがあるが、その後回復するので通常の管理を維持する。
 ③廃液は適正に処理する(廃液処理剤にはイレートキット等がある)。

※イレートキットで処理可能な薬剤: エコホープ＋スミチオン乳剤、エコホープドライ＋スミチオン乳剤、エコホープDJ＋スミチオン乳剤、スポルタックスターナSE、スミチオン乳剤、テクリードCフロアブル、テクリードCフロアブル＋スミチオン乳剤、トリフミンスターナSE、トリフミン乳剤、パダンSG水和剤、ヘルシードTフロアブル、ヘルシード水和剤、ヘルシードスターナフロアブル、ヘルシード乳剤、ベンレートT水和剤20、ホーマイ水和剤、モミガードC DF、モミガードC水和剤、タフブロック

作物1-2-1. 稻:種子處理劑

[illegible]

作物1-2-2. 稻:床土・覆土処理剤

[illegible]