


漁業者の皆様へ 周南市・防府市沿岸で魚介類を斃死させる カレニア ミキモトイが発生しています！

発 生 日	徳山湾：令和7年（2025年）8月8日（金） 周南市・防府市沿岸：令和7年（2025年）8月12日（火）
発 生 海 域	周南市沿岸（継続）・防府市沿岸（継続）
赤 潮 構 成 種	カレニア ミキモトイ（ <i>Karenia mikimotoi</i> ） （好適水温：22～27℃、好適塩分：20～30psu）
着色海域の色	暗褐色

大きさ：25～35 μm × 23～33 μm

調 査 結 果				
観測場所	細胞数	備 考		
戸田支店前	8 個/ml	8 月 28 日	10:45	29.4℃-水深 1.5m
深浦港	0 個/ml	8 月 28 日	10:25	28.0℃-水深 0.5m
落港	0 個/ml	8 月 28 日	10:45	29.5℃-水深 0.5m
下松センター桟橋	0 個/ml	8 月 28 日	11:00	28.5℃-水深 0.5m
櫛ヶ浜支店前	0 個/ml	8 月 28 日	11:45	30.5℃-水深 0.5m
周南市場前	0 個/ml	8 月 28 日	10:00	29.6℃-水深 0.5m
下松支店前	0 個/ml	8 月 28 日	11:18	29.0℃-水深 0.5m
新南陽市支店前	0 個/ml	8 月 28 日	10:25	29.8℃-水深 0.5m
富海漁港	0 個/ml	8 月 28 日	11:00	30.0℃-水深 0.5m
防府市場前	0 個/ml	8 月 28 日	11:30	30.2℃-水深 0.5m

【赤潮注意報：100 個/ml 以上、赤潮警報（魚類へい死目安）：5,000 個/ml】

特 記 事 項

- 本種は過去、**本県で最も大きな漁業被害が発生**したプランクトンです。
- 本種は中層・底層を中心に増殖し、パッチ状になって上下動を繰り返すことから、海面からの観察では海水の着色が判別しにくいプランクトンです。
- このため、**海面が着色していなくても、魚介類の斃死を起こすことがあります**ので、十分に注意して下さい。
- また、**室内実験ではアワビは 150 個/ml で衰弱、死亡が確認**されています。

留 意 事 項

- 今後は、漁港内での蓄養は避けて、活け $\times$ 出荷等の対策を講じてください。また、養殖魚等は深い生け簀を活用し、赤潮発生時には代謝を抑えるために餌止めをし、早期出荷などの対策も検討してください。
- 漁船の活け間内のスカッパを閉めて航行するなど、赤潮を含んだ海水が流入しないよう注意してください。
- なお、県は引き続き調査を実施して参りますので、赤潮の発生・魚介類の斃死などが確認された場合は、漁協を通じて関係市・農林水産事務所水産部に速やかに通報してください。
- また、赤潮による漁獲物の斃死等については、漁業被害救済基金の対象となる場合がありますので、漁獲物の処分等は行わず（被害数量等の確認が必要のため）、速やかに漁協を通じて関係市町・農林水産事務所水産部に通報してください。

※県内の赤潮情報については、海鳴りネットワークのホームページでもご覧いただけます。
→ <https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16500/suisan-s/akashio.html>