

## 山口県のがんの5年相対生存率（2016年）

5年相対生存率とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体\*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。

100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味する。


2016年診断患者における、全部位の5年相対生存率は62.0%であった。わが国に多いがんで

**図13 5年相対生存率と95%信頼区間（表12から作成）**

は、胃がん62.2%、大腸（結腸・直腸）がん70.2%、肝及び肝内胆管がん31.5%、肺がん37.1%、乳がん88.0%であった。その他のがんで、生存率が90%を超えるものは皮膚がん、前立腺がん、甲状腺がんで、生存率が30%満たないものは、胆のう・胆管がん、膵臓がん、脳・中枢神経系がんであった。

なお、症例数が少なく、信頼区間が広いがんは解釈に注意が必要である。

(\* : 正確には性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団)



(対象)

- ・DCO症例は除く
  - ・上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性、性状不詳は含まれていない。
  - ・多重がんのあるケースでは、2番目以降に発生したがんは含まれていない。
  - ・年齢不詳および100歳以上の症例は含まれていない。
- 棒グラフ : 5年相対生存率を示す  
 ピン : 95%信頼区間を示す  
 ピン : 95%信頼区間  
 ピン : 95%の確率で真の値が含まれる区間

注 全国がんモニタリング集計が終了しており、全国データの更新がないため、山口県のデータのみ掲載。


## 山口県のがんの部位別・臨床進行度別5年相対生存率（2016年）

臨床進行度別にみると、全部位の5年相対生存率は、限局89.8%、領域59.0%、遠隔16.3%であった。臨床進行度が限局にとどまっている場合、多くのがんの5年相対生存率が90%を越えていたが、肝および肝内胆管がんでは46.9%、症例数は多くないが、胆のう・胆管がんでは46.5%、膵臓がんでは34.3%であった。

遠隔転移の場合、限局や領域と比べると多くのがんでは5年相対生存率が低かったが、前立腺がんは54.6%、乳がんは42.3%とそれほど低くない傾向がみられた。

なお、症例数が少ないがんは解釈に注意が必要である。

図14 部位別・進行度別5年相対生存率と95%信頼区間（表13から作成）



### (対象)

- DCO症例は除く
- \*領域は領域リンパ節転移と隣接臓器浸潤を含む
- 上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性、性状不詳は含まれていない。
- 多重がんのあるケースでは、2番目以降に発生したがんは含まれていない。
- 年齢不詳及び100歳以上の症例は含まれていない。

棒グラフ

: 5年相対生存率を示す

: 95%信頼区間を示す

95%信頼区間

95%の確率で真の値が含まれる区間

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

2016年

山口県

部位	ICD-10	男		女		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	
		全部位	C00-C96	6	592													
口腔・咽頭	C00-C14	183	49.9	4.2	78	58.8	6.5	261	52.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
食道	C15	212	43.9	3.9	37	40.5	8.6	249	43.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
胃	C16	1,036	64.2	1.9	490	58.1	2.7	1,526	62.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,014	71.4	1.9	799	68.6	2.0	1,813	70.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
結腸	C18	670	72.0	2.4	569	66.2	2.4	1,239	69.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
直腸	C19-C20	344	70.5	3.1	230	74.2	3.5	574	72.1	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
肝および肝内胆管 胆のう・胆管	C22	338	31.7	3.0	194	31.1	3.8	532	31.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
脾臓	C23-C24	139	27.1	4.4	117	14.6	3.7	256	21.4	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
臍	C25	230	10.6	2.2	224	10.5	2.2	454	10.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
喉頭	C32	42	79.1	10.1	8	78.5	17.0	50	80.1	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
肺	C33-C34	985	31.6	1.7	467	48.4	2.6	1,452	37.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
皮膚	C43-C44	138	93.1	5.9	158	88.3	5.3	296	90.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
乳房	C50	6	73.3	23.6	964	88.0	1.4	970	88.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
子宮	C53-C55	-	-	-	271	78.3	2.9	271	78.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
子宮頸部	C53	-	-	-	114	79.3	4.2	114	79.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
子宮体部	C54	-	-	-	148	79.6	3.9	148	79.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
卵巢	C56	-	-	-	112	61.3	4.9	112	61.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
前立腺	C61	1,187	94.8	1.6	-	-	-	1,187	94.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
膀胱	C67	255	78.6	3.9	88	58.0	6.8	343	73.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
腎・尿路（膀胱除<）	C64-C66 C68	209	63.4	4.1	110	71.6	5.4	319	66.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
脳・中枢神経系	C70-C72	35	24.2	7.5	29	25.4	8.4	64	24.9	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
甲状腺	C73	40	96.6	4.6	147	90.8	2.9	187	93.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	191	62.4	4.4	189	70.1	3.9	380	66.4	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
多発性骨髓腫	C88-C90	46	49.7	8.4	40	34.1	8.2	86	42.5	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
白血病	C91-C95	90	31.6	5.5	82	45.5	6.1	172	38.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

部位	ICD-10	進展度・総合	男		女		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差
			集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差												
全部位	C00-C96	限局	3,031	89.9	1.0	2,159	89.7	1.0	5,190	89.8	0.7							
		リ転	560	62.8	2.5	543	76.4	2.1	1,103	69.7	1.7							
		隣接	858	52.1	2.1	585	48.7	2.3	1,443	50.7	1.5							
		遠隔	1,322	14.3	1.1	788	19.6	1.5	2,110	16.3	0.9							
		不明	683	33.7	2.3	581	33.1	2.3	1,264	33.4	1.6							
		合計	6,592	60.8	0.8	4,778	63.7	0.8	11,370	62.0	0.6							
口腔・咽頭	C00-C14	限局	60	79.0	6.9	30	86.0	8.2	90	82.8	5.4							
		リ転	31	51.6	9.7	9	61.6	18.9	40	53.9	8.7							
		隣接	56	32.3	7.0	21	25.7	10.4	77	31.4	5.8							
		遠隔	10	10.6	10.2	3	34.3	29.0	13	16.3	10.7							
		不明	26	29.4	10.0	15	38.9	15.3	41	33.9	8.5							
		合計	183	49.9	4.2	78	58.8	6.5	261	52.6	3.5							
領域		87	40.2	5.8	30	36.9	9.8	117	39.6	5.0								
口腔・咽頭	C15	限局	73	71.2	6.8	13	78.5	12.3	86	72.8	6.0							
		リ転	24	51.3	11.7	5	0.0	0.0	29	42.3	10.4							
		隣接	59	32.9	6.7	13	32.1	13.6	72	32.9	6.0							
		遠隔	34	3.2	3.3	2	0.0	0.0	36	3.0	3.1							
		不明	22	34.0	11.4	4	0.0	0.0	26	30.3	10.3							
		合計	212	43.9	3.9	37	40.5	8.6	249	43.5	3.5							
領域		83	38.7	6.0	18	23.2	10.4	101	36.0	5.3								
胃	C16	限局	574	93.7	2.1	250	93.6	3.0	824	93.9	1.7							
		リ転	126	58.2	5.5	48	44.3	7.9	174	54.2	4.6							
		隣接	79	40.4	6.5	46	33.1	7.8	125	37.6	5.0							
		遠隔	191	1.8	1.0	103	4.4	2.2	294	2.8	1.0							
		不明	66	19.7	6.2	43	16.3	7.4	109	18.8	4.7							
		合計	1,036	64.2	1.9	490	58.1	2.7	1,526	62.2	1.6							
領域		205	51.3	4.3	94	38.9	5.6	299	47.2	3.4								
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	464	91.2	2.5	345	91.9	2.5	809	91.7	1.8							
		リ転	188	88.3	3.8	149	79.2	4.1	337	84.4	2.8							
		隣接	107	74.4	5.9	88	68.1	6.1	195	71.9	4.2							
		遠隔	185	17.1	3.0	153	18.3	3.3	338	17.6	2.2							
		不明	69	30.5	7.0	64	35.5	7.4	133	33.0	5.1							
		合計	1,014	71.4	1.9	799	68.6	2.0	1,813	70.2	1.4							
領域		295	83.3	3.3	237	75.1	3.5	532	79.9	2.4								

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く  
 リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臟器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移十隣接臟器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男		女		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差
			ICD-10	集計対象数	1	5年相対生存率												
結腸	C18	限局	317	93.8	3.0	238	90.9	3.1	555	92.9	2.2							
		リ転	106	88.0	5.3	100	76.4	5.3	206	83.0	3.8							
		隣接	74	76.1	7.3	65	69.9	7.1	139	73.4	5.1							
		遠隔	125	15.4	3.5	117	16.5	3.7	242	15.9	2.5							
		不明	47	25.2	8.3	49	33.8	8.5	96	30.1	6.0							
		合計	670	72.0	2.4	569	66.2	2.4	1,239	69.3	1.7							
直腸	C19-C20	限局	147	85.6	4.2	107	92.5	4.1	254	89.1	3.0							
		リ転	82	86.8	5.5	49	83.9	6.5	131	86.5	4.2							
		隣接	33	70.8	9.9	23	61.5	11.7	56	68.1	7.6							
		遠隔	60	20.6	5.6	36	23.4	7.4	96	21.9	4.5							
		不明	22	37.8	12.2	15	37.3	14.8	37	38.7	9.4							
		合計	344	70.5	3.1	230	74.2	3.5	574	72.1	2.3							
肝および肝内胆管	C22	限局	190	46.8	4.3	121	47.0	5.5	311	46.9	3.4							
		リ転	6	0.0	0.0	6	0.0	0.0	12	0.0	0.0							
		隣接	39	21.2	7.6	17	6.6	6.8	56	16.9	5.8							
		遠隔	38	0.0	0.0	17	0.0	0.0	55	0.0	0.0							
		不明	65	13.6	4.8	33	7.0	4.8	98	11.3	3.6							
		合計	338	31.7	3.0	194	31.1	3.8	532	31.5	2.3							
胆のう・胆管	C23-C24	限局	45	19.5	6.8	23	5.2	5.1	68	14.7	4.9							
		リ転	22	50.8	13.0	26	41.7	11.6	48	46.5	8.7							
		隣接	8	29.8	19.6	3	0.0	0.0	11	21.4	14.7							
		遠隔	63	37.7	7.2	39	14.8	6.2	102	28.8	5.1							
		不明	31	0.0	0.0	26	0.0	0.0	57	0.0	0.0							
		合計	15	0.0	0.0	23	0.0	0.0	38	0.0	0.0							
		領域	139	27.1	4.4	117	14.6	3.7	256	21.4	2.9							
脾臓	C25	限局	71	37.0	6.8	42	13.8	5.8	113	28.3	4.9							
		リ転	22	35.7	11.8	27	32.6	9.7	49	34.3	7.5							
		隣接	6	17.4	16.2	2	0.0	0.0	8	13.0	12.4							
		遠隔	69	13.3	4.4	65	13.8	4.6	134	13.5	3.2							
		不明	120	3.7	1.9	105	2.0	1.5	225	3.0	1.2							
		合計	13	9.3	9.5	25	13.9	8.1	38	12.3	6.2							
		領域	230	10.6	2.2	224	10.5	2.2	454	10.5	1.5							
			75	13.7	4.3	67	13.3	4.4	142	13.5	3.1							

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く  
 リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔臓器転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

部位	ICD-10	進展度・総合	男		女		集計対象数	1年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1年相対生存率	標準誤差
			ICD-10	ICD-10	ICD-10	ICD-10									
喉頭	C32	限局	25	83.6	13.3	5	82.1	19.8	-	30	83.4	11.4	-	-	-
		リ転	3	37.9	35.7	0	-	-	-	3	37.9	35.7	-	-	-
		隣接	7	60.7	21.7	1	100.0	0.0	0.0	8	65.8	19.5	-	-	-
		遠隔	1	0.0	0.0	0	-	-	-	1	0.0	0.0	-	-	-
		不明	6	75.0	25.3	2	51.4	43.2	-	8	72.8	22.1	-	-	-
		合計	42	79.1	10.1	8	78.5	17.0	-	50	80.1	8.9	-	-	-
肺	C33-C34	限局	282	73.5	3.7	196	86.8	3.3	478	79.2	-	-	-	-	-
		リ転	112	35.2	5.0	36	34.2	8.6	148	35.0	4.3	-	-	-	-
		隣接	82	35.6	5.9	29	40.4	10.4	111	36.9	5.2	-	-	-	-
		遠隔	409	5.5	1.2	142	10.9	2.8	551	6.9	1.2	-	-	-	-
		不明	100	13.0	4.1	64	22.6	6.2	164	16.8	3.5	-	-	-	-
		合計	985	31.6	1.7	467	48.4	2.6	1,452	37.1	1.4	-	-	-	-
		領域	194	35.4	3.8	65	36.9	6.6	259	35.8	3.3	-	-	-	-
皮膚	C43-C44	限局	121	97.1	6.2	127	99.5	5.3	248	99.1	4.1	-	-	-	-
		リ転	0	-	-	5	20.9	18.9	5	20.9	18.9	-	-	-	-
		隣接	10	56.2	20.0	10	42.0	22.3	20	51.6	15.3	-	-	-	-
		遠隔	3	34.6	31.9	0	-	-	3	34.6	31.9	-	-	-	-
		不明	4	54.5	55.1	16	26.9	14.1	20	38.3	16.1	-	-	-	-
		合計	138	93.1	5.9	158	88.3	5.3	296	90.9	3.9	-	-	-	-
		領域	10	56.2	20.0	15	34.2	15.7	25	44.8	12.7	-	-	-	-
乳房	C50	限局	0	-	-	531	99.8	1.2	531	99.8	1.2	-	-	-	-
		リ転	4	56.9	32.9	215	91.6	2.5	219	91.2	2.5	-	-	-	-
		隣接	2	100.0	0.0	37	74.0	9.5	39	75.8	9.1	-	-	-	-
		遠隔	0	-	-	67	42.3	6.5	67	42.3	6.5	-	-	-	-
		不明	0	-	-	114	51.5	5.1	114	51.5	5.1	-	-	-	-
		合計	6	73.3	23.6	964	88.0	1.4	970	88.0	1.4	-	-	-	-
		領域	6	73.3	23.6	252	89.6	2.6	258	89.4	2.6	-	-	-	-
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	160	96.5	2.3	160	96.5	2.3	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	9	68.4	16.7	9	68.4	16.7	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	62	57.2	6.8	62	57.2	6.8	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	19	21.7	9.7	19	21.7	9.7	-	-	-	-
		不明	-	-	-	21	47.0	13.5	21	47.0	13.5	-	-	-	-
		合計	-	-	-	271	78.3	2.9	271	78.3	2.9	-	-	-	-
		領域	-	-	-	71	59.0	6.3	71	59.0	6.3	-	-	-	-

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く  
 リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臟器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移十隣接臟器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

部位	ICD-10	進展度・総合	男						女						男女計	
			集計対象数			1 5年相対生存率			標準誤差			集計対象数				
			1	5年相対生存率	標準誤差	1	5年相対生存率	標準誤差	1	5年相対生存率	標準誤差	1	5年相対生存率	標準誤差		
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	61	94.5	3.3	61	94.5	3.3	61	94.5	3.3	3.3	
		リ転	-	-	-	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	
		隣接	-	-	-	37	61.0	8.9	37	61.0	8.9	37	61.0	8.9	8.9	
		遠隔	-	-	-	9	34.5	16.3	9	34.5	16.3	9	34.5	16.3	16.3	
		不明	-	-	-	6	69.2	20.1	6	69.2	20.1	6	69.2	20.1	20.1	
		合計	-	-	-	114	79.3	4.2	114	79.3	4.2	114	79.3	4.2	4.2	
子宮体部	C54	限局	-	-	-	38	62.1	8.8	38	62.1	8.8	38	62.1	8.8	8.8	
		リ転	-	-	-	98	97.0	3.1	98	97.0	3.1	98	97.0	3.1	3.1	
		隣接	-	-	-	8	64.3	18.3	8	64.3	18.3	8	64.3	18.3	18.3	
		遠隔	-	-	-	24	51.6	10.6	24	51.6	10.6	24	51.6	10.6	10.6	
		不明	-	-	-	10	10.2	9.9	10	10.2	9.9	10	10.2	9.9	9.9	
		合計	-	-	-	8	33.1	24.3	8	33.1	24.3	8	33.1	24.3	24.3	
卵巣	C56	限局	-	-	-	32	55.6	9.2	32	55.6	9.2	32	55.6	9.2	9.2	
		リ転	-	-	-	22	87.2	7.5	22	87.2	7.5	22	87.2	7.5	7.5	
		隣接	-	-	-	2	50.8	37.8	2	50.8	37.8	2	50.8	37.8	37.8	
		遠隔	-	-	-	52	63.9	7.0	52	63.9	7.0	52	63.9	7.0	7.0	
		不明	-	-	-	19	38.0	11.5	19	38.0	11.5	19	38.0	11.5	11.5	
		合計	-	-	-	17	41.6	14.2	17	41.6	14.2	17	41.6	14.2	14.2	
前立腺	C61	領域	-	-	-	112	61.3	4.9	112	61.3	4.9	112	61.3	4.9	4.9	
		限局	749	100.0	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	
		リ転	12	96.4	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	
		隣接	135	94.1	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	
		遠隔	133	54.6	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	
		不明	158	57.1	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	
膀胱	C67	領域	1,187	94.8	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	
		限局	172	91.7	4.2	58	66.3	8.2	58	66.3	8.2	58	66.3	8.2	8.2	
		リ転	5	45.0	28.0	3	44.1	44.0	3	44.1	44.0	3	44.1	44.0	44.0	
		隣接	29	47.1	12.1	10	56.0	19.0	10	56.0	19.0	10	56.0	19.0	23.8	
		遠隔	12	0.0	0.0	6	0.0	0.0	6	0.0	0.0	6	0.0	0.0	0.0	
		不明	34	53.9	11.5	11	39.7	19.6	11	39.7	19.6	11	39.7	19.6	10.1	
領域	C67	合計	255	78.6	3.9	88	58.0	6.8	88	58.0	6.8	88	58.0	6.8	3.4	
		領域	34	47.9	11.1	13	54.2	17.6	13	54.2	17.6	13	54.2	17.6	9.5	

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く  
 リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臟器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臟器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

部位	ICD-10	進展度・総合	男		女		集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1	5年相対生存率	標準誤差
			ICD-10	1	ICD-10	1												
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	115	87.6	4.7	65	88.5	5.8	180	88.2	3.7	-	-	-	-	-	-	-
リ転	6	18.4	18.0	2	51.1	39.1	8	27.4	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
隣接	40	49.0	9.5	18	61.4	13.1	58	53.3	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔	34	14.3	6.7	13	16.2	10.8	47	15.1	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	14	35.1	15.7	12	43.8	20.5	26	43.1	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	209	63.4	4.1	110	71.6	5.4	319	66.3	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
領域	46	45.2	8.7	20	60.7	12.4	66	50.4	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	22	28.7	10.0	20	20.9	9.6	42	25.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-
リ転	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
隣接	6	0.0	0.0	4	50.2	25.2	10	20.5	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔	1	0.0	0.0	0	-	-	1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	6	36.1	21.0	5	21.4	19.4	11	29.5	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	35	24.2	7.5	29	25.4	8.4	64	24.9	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
領域	6	0.0	0.0	4	50.2	25.2	10	20.5	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
甲状腺	C73	限局	16	96.6	7.0	69	98.6	2.1	85	98.7	2.1	-	-	-	-	-	-	-
リ転	14	94.1	7.3	40	95.8	3.6	54	96.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
隣接	7	89.3	14.9	11	75.1	14.4	18	83.0	10.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔	0	-	-	5	41.4	23.1	5	41.4	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	3	100.0	0.0	22	62.2	11.3	25	67.4	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	40	96.6	4.6	147	90.8	2.9	187	93.3	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
領域	21	93.6	6.9	51	92.5	4.3	72	95.1	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	49	79.3	8.0	46	90.6	6.6	95	84.8	5.2	-	-	-	-	-	-	-
リ転	5	45.1	26.2	2	100.0	0.0	7	62.5	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
隣接	28	77.0	11.7	29	73.1	9.4	57	76.0	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔	84	55.0	6.4	77	67.4	6.1	161	61.1	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	24	38.7	11.7	34	38.4	9.3	58	38.5	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	191	62.4	4.4	189	70.1	3.9	380	66.4	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
領域	33	72.7	10.9	31	75.1	8.9	64	74.8	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く  
 リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔臓器転移十隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数	1 5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1 5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	1 5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 ICD、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く  
 リ転：領域リシンバ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔臓器転移、領域：領域リシンバ節転移十隣接臓器浸潤