

作物1-11. 稲・無人ヘリ・無人航空機用・殺菌剤

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病 紋枯病 黄化米 穂こうじ病 (エヒゴツカム菌) 穂枯れ (こま葉枯病菌)	ウンカ類 ごま葉枯病 稲こうじ病 ツマグリヨコバイ ヒメトビウナ ウンカ類幼虫 ウンカ類	備考
					スクミリンゴガイ イネドロオウムシ イナゴ類 カメムシ類 フタオビコヤガ ニカメイチュウ コブノメイガ ツマガリヨコバイ幼虫 ツマグリヨコバイ ヒメトビウナ ウンカ類幼虫 ウンカ類	飼料用米(粳)に出 穂以降も使用可 WCS用稲に使用可

(液剂)

[illegible]

作物1-12. 稲・無人ヘリ・無人航空機用・殺菌剤

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	いもち病 紋枯病 黄化米 穂こうじ病 (エヒゴツカム菌) 穂枯れ (こま葉枯病菌)	ウンカ類 ごま葉枯病 稲こうじ病 ツマグリヨコバイ ヒメトビウナ ウンカ類幼虫 ウンカ類 ごま葉枯病 稲こうじ病 ツマグリヨコバイ ヒメトビウナ ウンカ類幼虫 ウンカ類	備考
						飼料用米(粳)に出穂以降も使用可 WCS用稲に使用可
						スクミリンゴガイ イネドロオウムシ イナゴ類 カメムシ類 フタオビコヤガ ニカメイチュウ コブノメイガ ツマガリヨコバイ幼虫 ツマグリヨコバイ ヒメトビウナ ウンカ類幼虫 ウンカ類

(粒剂)

3		シメコナゾール	モンガリット1キロ粒剤	○		○												○	墨黒穂病にも適用あり。
6		イソプロチオラン	フジワン1キロ粒剤	○		○													高温登熟下における白未熟粒の発生軽減、登熟歩合向上にも適用あり。
16.3		トルブロカルブ	サンプラス粒剤18	○														○	もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病にも適用あり。
16・3		トルブロカルブ	ゴウケツ粒剤500	○															もみ枯細菌病、内穎褐変病、白葉枯病にも適用あり。
16.1		ピロキロン	コラトップ粒剤24	○														○	－
P02		プロベナゾール	オリゼメート粒剤20	○														○ ○	－
		プロベナゾール	オリゼメート粒剤40	○														○ ○	
4A		ジノテフラン	スタークル1キロH粒剤 スタークルメイト1キロH粒剤					○		○			○	○				○ ○	イネミズゾウムシにも適用あり。 粒剤は大型種カメムシ類では効果が劣る。
	不明	磷酸第二鉄	スクミンペイト3												○			○ ○	－
	不明	メタアルデヒド	スクミノン												○			○	－

作物1-13. 稲・無人ヘリ・無人航空機用・殺虫剤

[illegible]

(液剂)

[illegible]

作物1－14. 稲・無人ヘリ・無人航空機用・殺虫殺菌剤

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	いもち病	紋枯病	穂枯れ(黄色米)	穂こじ病	こま葉枯病	ウンカ類	ウンカ類幼虫	ヒメトビウンカ	ツマグロヨコバイ	ツマグロヨコバイ幼虫	コブノメイガ	ニカメイチュウ	フタオビコヤガ	カメムシ類	イナゴ類	イネドロオウムシ	スクミリンゴガイ					WCS用稲に使用可	飼料用米(粳)に出	備考
--------	--------	-----	-----	------	-----	----------	------	-------	------	--------	---------	----------	------------	--------	---------	---------	-------	------	----------	----------	--	--	--	--	-----------	-----------	----

(液剤)

16.1	4A	ジノテフラン・トリシクラゾール水和剤 10.8%	ビームエイトスタークルゾル	○					○		○						○											ミツバチに対して影響あり
U14 16.1	3A	シラフルオフェン・フェリムゾン・フサライド	ブラシンジョーカーフロアブル	○					○								○											ミツバチに対して影響あり。
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド	ブレードスタークルゾル	○		○	○		○		○						○								○			内臓褐変病、変色米(カーブリア、アルタリア)、籾枯細菌病にも適用あり。ミツバチに対して影響あり
U14 16.1	4A	ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド	ブレードスタークルRゾル	○					○								○								○			ミツバチに対して影響あり
U16	2B	エチプロール・テブフロキン	トライクフロアブル トライトラムフロアブル	○			○		○								○									○		ミツバチに対して影響あり
7	16 18	テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル	アブロードロムダンモンカットエアー		○					○			○	○	○										○			－
7	18 UN	テブフェノジド・ベンズピリモキサン・フルトラニル	オーケストラロムダンモンカットエアー		○					○			○	○	○										○			イネツトムシにも適用あり。
1	4A	ジノテフラン・チオファネートメチル	トップジンスタークルフロアブル	○	○				○								○								○	○		ミツバチに対して影響あり
U16	4F	フルピリミン・テブフロキン	トライエミリアフロアブル	○		○			○		○						○		○									
16.1 U18 U14	4A	クロチアニジン・トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン	ノンプラスバリダダントツフロアブル	○	○				○								○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり

(粒剤)

16.1	4A	ジノテフラン・ピロキロン	コラトップスタークル1キロ粒剤	○					○		○						○								○			粒剤は大型種カメムシ類では効果が劣る。
------	----	--------------	-----------------	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---------------------