

果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	------------	----------	---------	-------	----

苗木・殺虫剤

		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤、スタークル顆粒水溶剤						○														
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤					○	○	○										○			ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。
		アセタミプリド	モスビラン粒剤					○	○														
	28	シアントラニリプロール	エクシレルSE					○	○	○										※			※成虫で適用
	12C	BPPS	オマイト水和剤	○		○																	かんきつ(ミカンを除く)で適用。幼木では新芽の生育期間、成木では春芽が硬化するまでの期間は使用を避ける。 サビダニ類で登録

果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
			かいよう病 そうか病 灰色かび病 褐色腐敗病 黒点病 小黒点病 そばかす病 炭疽病 黄斑病 幹腐病 苗疫病 貯蔵病害黒かび病 貯蔵病害黒腐病 貯蔵病害黒斑病 貯蔵病害軸腐病 ミカンサビダニ ミカンハダニ チャノホコリダニ	

殺菌剤

[illegible]

果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	かいよう病	そうか病	灰色かび病	褐色腐敗病	黒点病	小黒点病	そばかす病	炭疽病	黄斑病	幹腐病	苗疫病	貯蔵病害青かび病	貯蔵病害緑かび病	貯蔵病害黒腐病	貯蔵病害黒斑病	貯蔵病害軸腐病	チャノキローアザミウマ	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	備考
--------	--------	-----	-----	-------	------	-------	-------	-----	------	-------	-----	-----	-----	-----	----------	----------	---------	---------	---------	-------------	--------	---------	----------	----

殺菌剤

U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5	○																						抵抗性誘導が主な作用機作なので、早めに回数多く散布する。
M01		銅	ICボルドー66D	○	○		○																			新梢伸長期及び高温期の散布は避ける。 ナメクジ類、カタツムリ類に登録あり
			クプロシールド	○	○		○																			炭酸カルシウム剤(クレフノン)を加用する。 クプロシールドはナメクジ類とカタツムリ類、クミガードSCはナメクジ類に適用あり
			コサイド3000	○			○	○																		
			Zボルドー	○	○							○														
		水酸化第二銅	クミガードSC	○	○			○																		
M02 M01	UN	硫黄・銅	園芸ボルドー	○	○		○																○	○		
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤				○	○	○	※	○	○								○		○			かんきつ(みかんを除く)で適用 ※炭疽病は炭疽病(さび果)で適用	
			ベンコゼブ水和剤				○	○	○	○	○										○		○			かんきつ(みかんを除く)で適用
M07		イミノクタジナルベシル酸塩	ベルケートフロアブル		○	○						○		○	○	○		○								かんきつ(みかんを除く)で適用
		イミノクタジナルベシル酸塩	ベルケート水和剤		○	○									○											かんきつ(みかんを除く)で適用
M09		ジチアノン	デランフロアブル(劇)		○			○			※															かぶれに注意する。中晩柑に使用 する場合は、収穫後長期貯蔵する 場合、貯蔵中果皮に斑点が発生 することがあるので散布を避ける。 ※炭疽病は炭疽病(さび果)で適用
24 M01		カスガマイシン・銅	カスミンボルドー	○																						かんきつ(みかんを除く)で適用 炭酸カルシウム剤(クレフノン)を加用する。

果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	----------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	------------	----------	---------	-------	----

殺虫剤

	(気)	マシン油	機械油乳剤95	※1		※2									※3	※3								※1ハダニ類、ハダニ類の越冬卵で適用 ※2サビダニで適用 ※3ヤノネカイガラムシ、その他のカイガラムシで適用 樹勢の弱っている場合は散布しない。
		マシン油	アタックオイル		○	○									○									ミカンキジラミに適用あり
			トモノールS	○											○	※								※幼虫で適用 ・樹勢の弱っている場合は散布しない。
			ハーベストオイル		○										○									
		還元澱粉糖化物	エコピタ液剤	※	○			○																※ハダニ類(ミカンハダニを除く)で適用 うどんこ病に適用あり
		ポリグリセリン脂肪酸エステル	フーモン	○																				
		調合油	サフオイル乳剤		○	※																		※サビダニ類で適用
	1A	アラニカルブ	オリオン水和剤40(劇)						○	○	○	○	○		○							○	○※	※成虫で適用 ハマキムシ類、ケムシ類、カネタタキ、ヨモギエダシャク、クワノミハムシに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
		PAP	エルサン乳剤(劇)				○	○	○			○	○	○	※1	○			○	○	※2	※3		※1カイガラムシ類(ヤノネカイガラムシを除く)で適用 ※2成虫で適用 ※3成虫で適用 ハマキムシ類に適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
		MEP	スミチオン乳剤					○			○	○	○	○	※			○						かんきつ(みかんを除く)で適用 ※ナシマルカイガラムシ(サンホーゼカイガラムシ)で適用 カネタタキ、ハマキムシ類、ミカンツボミタマバエ、ミカンキジラミ、フラバゾウムシに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
	2B	エチプロール	キラップフロアブル					○					※											※チャノキイロアザミウマで適用 カネタタキで適用あり 着色始期以降での使用は、果実に薬害を生ずる恐れがあるので使用しない。 ミツバチに対して影響あり。

果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	----------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	------------	----------	---------	-------	----

殺虫剤

	3A	シベルメトリン	アグロスリン水和剤 (劇)						○					○	○								※	※成虫で適用 アケビコノハ、ヒメエグリバに適用 あり。 ミツバチに対して影響あり。	
		ベルメトリン	アディオソ乳剤						○	○				※	○									※	※チャノキイロアザミウマで適用 ミツバチに対して影響あり。
		ピフェントリン	テルスター水和剤						○	○				※	○									※	※チャノキイロアザミウマで適用 ミツバチに対して影響あり。
		フルバリネート	マブリック水和剤20 (劇)						○	○		○	○	※	○										かんきつ(みかんを除く)で適用 ※チャノキイロアザミウマで適用 ケムシ類でも適用あり
		フェンプロパトリン	ロビンフッド																				※		※カミキリムシ類で適用 スカシバ類に適用あり 樹幹・樹枝の食入孔にノズルを差 し込み噴射
	4A	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤						○	○		○	○	○	○		○	○				※ 1	※ 2	※1成虫で適用 ※2成虫、幼虫で適用 ミカンキジラミに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。	
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル (劇)						○	○				○	○	○							※	○	※成虫で適用 ミカンキジラミに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤、 スタークル顆粒水溶剤						○	○		○	○	※ 1	○	※ 2	○		○	※ 3		○	○	※1チャノキイロアザミウマで適用 ※2アカマルカイガラムシ、サン ホーゼカイガラムシで適用 ※3コナジラミ類で適用 チャノミドリヒメコバイ、アオバハ ゴロモ、ミカンキジラミに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。	
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤						○	○	○	○	○	○	○	※ 1		※ 2	○	※ 3		○	※ 4	※1アカマルカイガラムシ、ナシマ ルカイガラムシで適用 ※2ツノロウムシで適用 ※3コナジラミ類で適用 ※4ミカンバエは2000倍を推奨 カネタタキ、ミカンキジラミ、アオバ ハゴロモに適用あり ミツバチおよびマルハナバチに対 して影響あり。	
									○													○		樹幹散布 ミカンキジラミに適用あり。 ミツバチおよびマルハナバチに対 して影響あり。	
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤 (劇)						○	○	○	○	○	○	○				※ 1		※ 2	※ 3		※1コナジラミ類で適用 ※2成虫で適用 ※3ミカンバエ は2000倍を推奨	
		アセタミプリド	モスピランSL液剤(劇)						○	○	○	○	○	○	○				※ 1		※ 2	※ 3		※1コナジラミ類で適用 ※2成虫で適用 ※3ミカンバエは 2000倍を推奨	
4C	スルホキサフロル	トランスフォームフロア ブル						○					○	○								※		ミツバチに対して影響あり。 ※成虫で適用	

果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケンキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	ヤノネカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	------------	----------	---------	-------	----

殺虫剤

	5	スピノサド	スピノエースフロアブル						○	※		○											※ナミアゲハで適用 ヨモギエダシャクにも適用あり ミツバチに対して影響あり。
		スピネトラム	ディアナWDG						○	○		○						※		○			※コナジラミ類で適用 ヨモギエダシャク、ケムシ類、ハマ キムシ類に適用あり。ミツバチに 対して影響あり。
	6	レピメクチン	アニキ乳剤			○	○		○	○		※											かんきつ(みかんを除く)で適用 ※チャノキイロアザミウマで適用 ミツバチおよびマルハナバチに 対して影響あり。
		アバメクチン	アグリメック(劇)			○	○		○			○											ヨモギエダシャク、ナメクジ類にも 適用あり ミツバチおよびマルハナバチに 対して影響あり。
		ミルベメクチン	コロマイト水和剤	○		○	○																ミカンキジラミに適用あり。 ミツバチに対して軽度の影響あり。
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤					○				※ 1		○				※ 2				※ 3	※1チャノキイロアザミウマで適用 ※2コナジラミ類で適用 ※3成虫で適用 カイガラムシ類、アカマルカイガラ ムシに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
	12C	BPPS	オマイト水和剤	○		○																	かんきつ(ミカンを除く)で適用。幼 木では新芽の生育期間、成木で は春芽が硬化するまでの期間は 使用を避ける。また、果実の肥大 期～着色初期の散布は着色むら を生じることがあるので使用を避 ける。
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)			○	○					※								○			※ネギアザミウマを除く カネタタキに適用あり ヨモギエダシャクに適用あり。 ミツバチに対して影響あり。
	15	フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○	○		○				※											※チャノキイロアザミウマで適用ヨ モギエダシャクに適用あり
		ジフルベンズロン	デミリン水和剤					○				※											※チャノキイロアザミウマで適用
	16	ルフェスロン	マツチ乳剤			○		○	○			※											かんきつ(みかんを除く)で適用 ※チャノキイロアザミウマで適用 ヨモギエダシャクに適用あり
		ブプロフェジン	アブロード水和剤											※ 1					※ 2				かんきつ(みかん、すだちを除く)で 適用 ※1幼虫で適用 ※2若齢幼虫で適用
		ブプロフェジン	アブロードフロアブル											※ 1					※ 2				かんきつ(みかん、すだちを除く)で 適用 ※1幼虫で適用 ※2若齢幼虫で適用
	20B	アセキノシル	カネマイトフロアブル		○	○	○																
	20D	ビフェナゼート	マイトコーネフロアブル		○	○																	
	21A	ピリダベン	サンマイト水和剤(劇)		○	○	○					※ 1							※ 2				※1チャノキイロアザミウマで適用 ※2若齢幼虫で適用 ミツバチに対して影響あり。
		フェンピロキシメート	ダニトロンフロアブル		○	○																	
		トルフェンピラド	ハチハチフロアブル (劇)			※ 3	○	○				○				○		※ 1	○		※ 2		※1コナジラミ類で適用 ※2成虫で適用 ※3サビダニ類で適用 カネタタキ、ヨモギエダシャク、ヨコ バイ類、ミカンキジラミに適用あ り。 ミツバチに対して影響あり。

果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	備考
			ハダニ類	
			ミカンハダニ	
			ミカンサビダニ	
			チャノホコリダニ	
			アブラムシ類	
			ミゲハ類	
			アザミウマ類	
			ケシキスイ類	
			コアオハナムグリ	
			カイガラシ類	
			カメムシ類	
			ロウムシ類	
			ヤノネカイガラムシ	
			ミカントゲコナジラミ	
			ミカンコナジラミ	
			コナカイガラムシ類	

殺虫剤

[illegible]

果樹2. かんきつ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	ハダニ類	ミカンハダニ	ミカンサビダニ	チャノホコリダニ	アブラムシ類	ミカンハモグリガ	アゲハ類	コアオハナムグリ	ケシキスイ類	アザミウマ類	カメムシ類	カイガラムシ類	シノキカイガラムシ	ロウムシ類	コナカイガラムシ類	ミカンコナジラミ	ミカントゲコナジラミ	ゴマダラカミキリ	ハスモンヨトウ	ミカンバエ	備考
--------	--------	-----	-----	------	--------	---------	----------	--------	----------	------	----------	--------	--------	-------	---------	-----------	-------	-----------	----------	------------	----------	---------	-------	----

無人航空機・殺虫剤

	4A	クロチアニジン	ダントツ水溶剤					○	○	○	○	○	○	○	※1		※2	○	※3	※3	○	○	※1アカマルカイガラムシ、ナシマルカイガラムシで適用 ※2ツノロウムシで適用 ※3コナジラミ類で適用 アオバハゴロモ、カネタタキ、ミカンキジラミに適用あり。 ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。
	6	アバメクテン	アグリメック(劇)			○	○	○					○										ヨモギエダシヤクに適用あり。 ミツバチおよびマルハナバチに対して影響あり。
	25B	ピフルブミド	ダニコングフロアブル		○													○					
	28 15	シアントラニリブロール・ ルフェヌロン	ミネクトエクストラSC			○		○	○				※1								※2		かんきつ(みかんを除く)で適用 ※1チャノキイロアザミウマで適用 ※2成虫で適用 ミツバチに対して影響あり。