野菜24．ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病（リゾクトニア菌）	小菌核腐敗病	萎凋病	黒腐菌核病	ネコブセンチュウ	ネダニ類	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	シロイチモジヨトウ	ネギコガ	ハモグリバエ類	ネギハモグリバエ	タネバエ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	トビイロヒョウタンゾウムシ	クロバネキノコバエ類	タマネギバエ			備考
は種時・殺菌剤																								
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5	○																				
	1B	ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○													ミツバチに対して影響あり
定植前・殺菌剤																								
3		トリフルミゾール	トリフミン水和剤			○																		
	1B	カズサホス	ラグビーMC粒剤					○	○															
定植時・殺菌剤																								
7		ピラジフルミド	パレード20フロアブル				○																	育苗期後半～定植当日
	1B	イソキサチオン	カルホス微粒剤F(劇)							○														
		ダイアジノン	ダイアジノン粒剤5								○													ミツバチに対して影響あり
は種時・殺虫剤																								
	4A	ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤											○			○							ミツバチに対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ粒剤5															○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤												○			○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤												○			○						
育苗期・殺虫剤																								
	28	クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5											○										育苗期後半～定植当日
		シアントラニリプロール	ベリマークSC							○		○	○	○		○	○				○			育苗期後半～定植当日
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル											○				○						育苗期後半～定植当日。ミツバチに対して影響あり。
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤							○		○		○		○	○							育苗期後半
		アセタミプリド・シアントラニリプロール	アベイル粒剤									○			○			○						育苗期後半～定植当日
		クロラントラニリプロール・チアメトキサム	ジュリボフロアブル						○	○					○	○		○			○			育苗期後半～定植当日。ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜24．ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病（リゾクトニア菌）	小菌核腐敗病	萎凋病		ネコブセンチュウ	ネダニ類	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	シロイチモジヨトウ	ネギコガ	ハモグリバエ類	ネギハモグリバエ	タネバエ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	トビイロヒョウタンゾウムシ	クロバネキノコバエ類	タマネギバエ			備考
定植前・殺虫剤																								
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル（劇）												○		○			○				定植前日～定植時
		ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤									○	○	○		○	○							定植前日～定植時。ミツバチに対して影響あり
		アセタミプリド	モスピラン粒剤												○			○						定植前日～定植当日。白ねぎなど大ねぎに限る。
定植時・殺虫剤																								
	3A	テフルトリン	フォース粒剤(劇)						○	○											○			ミツバチに対して影響あり
	4A	イミダクロプリド	アドマイヤー1粒剤															○						ミツバチに対して影響あり
		ジノテフラン	アルバリン粒剤 スタークル粒剤											○				○						ミツバチに対して影響あり
		チアメトキサム	アクタラ粒剤5												○			○						ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ粒剤												○	○		○						
		アセタミプリド	モスピラン粒剤												○			○						
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤						○															
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤							○				○		○	○							ミツバチ及びマルハナバチ等に対して影響あり

野菜24. ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	一般名	商品名	苗立枯病（リゾクトニア菌）	べと病	さび病	黒斑病	小菌核腐敗病	白絹病	軟腐病	ボトリチス葉枯症	疫病	葉枯病	黄斑病	黒腐菌核病	リゾクトニア葉鞘腐敗病	小菌核病							備考
定植後・殺菌剤																								
1		チオファネートメチル	トップジンM粉剤DL					○																収穫7日前まで
2		プロシミドン	スミレックス水和剤					○							○									
3		テブコナゾール	オンリーワンフロアブル			○	○																	
		トリホリン	サプロール乳剤 セーフガード乳剤			○																		
		シメコナゾール	モンガリット粒剤					○	○						○		○							土寄せ時又は生育期(但し、収穫14日前まで)
11 4		アゾキシストロビン・メタラキシルM	ユニフォーム粒剤		○	○			○															
M03 4	UN	マンゼブ・メタラキシルM	リドミルゴールドMZ		○																			
4 M05		メタラキシルM・TPN	フォリオゴールド		○																			
7		フルトラニル	モンカットファイン粉剤20DL						○															
			モンカットフロアブル40						○															
			モンカット粒剤						○															
		ペンチオピラド	アフェットフロアブル			○	○	○	○				○		○		○							
		ピラジフルミド	パレード20フロアブル			○	○	○	○				○		○									
		インピルフルキサム	カナメフロアブル			○	○		○						○									
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー		○	○	○	○	○				○											ストレプトマイシン剤およびホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えること
11 7		ピラクロストロビン・ボスカリド	シグナムWDG		○	○	○																	
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル		○	○	○						○	○		○								
		ピコキシストロビン	メジャーフロアブル		○	○	○	○	○				○		○									
		ピリベンカルブ	ファンタジスタ顆粒水和剤			○	○	○	○				○		○		○							株元潅注
11 M05		アゾキシストロビン・TPN	アミスターオプティフロアブル		○	○	○	○					○	○										
12		フルジオキソニル	セイビアーフロアブル20					○	○						○									

野菜24. ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	苗立枯病（リゾクトニア菌）	べと病	さび病	黒斑病	小菌核腐敗病	白絹病	軟腐病	ボトリチス葉枯症	疫病	葉枯病	黄斑病	黒腐菌核病	リゾクトニア葉鞘腐敗病							備考
定植後・殺菌剤																							
14		トルクロホスメチル	リゾレックス水和剤						○														
19		ポリオキシン	ポリオキシンAL水和剤				○																
21		シアゾファミド	ランマンフロアブル		○																		
M07 19		イミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン	ポリベリン水和剤				○	○					○	○									ネギアザミウマにも適用あり
27 40		シモキサニル ・ベンチアバリカルブイソプロピル	ベトファイター顆粒水和剤		○																		
29		フルアジナム	フロンサイド粉剤					○	○														
31		オキソリニック酸	スターナ水和剤							○													
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)		○	○																	ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
40		マンジプロパミド	レーバスフロアブル		○																		
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル		○																		
40 M05		ベンチアバリカルブイソプロピル・TPN	プロポーズ顆粒水和剤		○								○										
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC		○																		
M04 M01		キャプタン・有機銅	オキシラン水和剤		○		○																
M03	UN	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤 ペンコゼブ水和剤		○	○	○																
M05		TPN	ダコニール1000	○	○	○	○	○					○										
P02		プロベナゾール	オリゼメート粒剤							○													土寄せ時(但し、収穫30日前まで)
U17		ピカルブトラゾクス	ピシロックフロアブル		○																		
U18		バリダマイシン	バリダシン液剤5						○	○													
		アゾキシストロビン・メタラキシルM	ユニフォーム粒剤												○								
定植後・無人航空機・殺菌剤																							
3		テブコナゾール	オンリーワンフロアブル			○	○																
7 M05		ペンチオピラド・TPN	ベジセイバー		○	○	○	○	○				○										ストレプトマイシン剤およびホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を加えること
11		アゾキシストロビン	アミスター20フロアブル		○	○							○										
45 40		アメトクトラジン・ジメトモルフ	ザンプロDMフロアブル		○																		
49 40		オキサチアピプロリン・マンジプロパミド	オロンディスウルトラSC		○																		

野菜24．ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	シロイチモジヨトウ	ネギコガ	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	ハモグリバエ類	ネギハモグリバエ	タネバエ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	ネダニ	タマネギバエ	クロバネキノコバエ類	トビイロヒョウタンゾウムシ	ヒョウタンゾウムシ類						備考
定植後・殺虫剤																								
	1A	メソミル	ランネート45DF(劇)		○								○			○								ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	1B	PAP	エルサン乳剤(劇)	○								○												
		イソキサチオン	ネキリエースK				○																	
		MEP	スミチオン乳剤	○		○						○												ミツバチに対して影響あり
		プロチオホス	トクチオン乳剤		○							○		※										※ネダニ類で適用
	3A	ビフェントリン	テルスター水和剤		○																			
		エトフェンプロックス	トレボン乳剤		○																			ミツバチに対して影響あり
		テフルトリン	フォース粒剤(劇)											○		○								ミツバチに対して影響あり
	4A	ジノテフラン	アルバリン顆粒水溶剤 スタークル顆粒水溶剤						○			○				○	○							ミツバチに対して影響あり
			アルバリン粒剤 スタークル粒剤						○			○				○								
		チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤							○			○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		イミダクロプリド	アドマイヤーフロアブル(劇)									○												ミツバチ及び野生ハナバチ類に対して影響あり
		クロチアニジン	ダントツ水溶剤							○			○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
			ダントツ粒剤							○			○	○										
		ニテンピラム	ベストガード水溶剤							○			○			○								
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤(劇)									○												
		アセタミプリド	モスピランSL液剤(劇)									○												
	5	スピノサド	スピノエース顆粒水和剤		○							○												
		スピネトラム	ディアナSC		○	○				○		○												ミツバチに対して影響あり
		脂肪酸グリセリド・スピノサド	ダブルシューターSE		○					○		○												キャプタンを含む農薬またはアゾキシストロビンを含む農薬との同時施用もしくは近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさける。
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤		○				○			○												
		レピメクチン	アニキ乳剤		○	○			○				○											ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
		アバメクチン	アグリメック(劇)							○		○												
		エマメクチン安息香酸塩・ルフェヌロン水和剤	ｱﾌｧｰﾑｴｸｾﾗ顆粒水和剤		○					○			○											
	9B	ピリフルキナゾン	コルト顆粒水和剤	○						○			○											
	11A	BT	フローバックDF		○																			
	13	クロルフェナピル	コテツフロアブル(劇)		○	○				○								○						ミツバチに対して影響あり
	14	カルタップ	パダンSG水溶剤(劇)						○			○				○								

野菜24．ねぎ

殺菌剤コード	殺虫剤コード	成分名	商品名	アブラムシ類	シロイチモジヨトウ	ネギコガ	ネキリムシ類	コガネムシ類幼虫	ハモグリバエ類	ネギハモグリバエ	タネバエ	アザミウマ類	ネギアザミウマ	ネダニ	タマネギバエ	クロバネキノコバエ類	トビイロヒョウタンゾウムシ						備考
定植後・殺虫剤																							
	15	クロルフルアズロン	アタブロン乳剤		○								○										
		フルフェノクスロン	カスケード乳剤		○					○			○			○							
		テフルベンズロン	ノーモルト乳剤		○																		
		ルフェヌロン	マッチ乳剤		○								○										
	18	メトキシフェノジド	ファルコンフロアブル		○																		
		クロマフェノジド	マトリックフロアブル		○																		
39	21A	トルフェンピラド	ハチハチ乳剤(劇)	○	○	○				○		○				○							ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF ファイントリムDF		○																		ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○																		
			アクセルベイト				○																
	23	スピロテトラマト	モベントフロアブル									○											
	28	フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○																	
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5		○	○			○														
		シアントラニリプロール	プリロッソ粒剤オメガ						○			○											
			ベリマークSC		○		○		○			○	○										
			ベネビアOD		○				○			○											ミツバチに対して影響あり。
		テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル		○	○			○			○				○							ミツバチに対して影響あり
	4A 28	シアントラニリプロール・チアメトキサム	ミネクトデュオ粒剤		○				○			○											
	29	フロニカミド	ウララDF										○										
	30	フルキサメタミド	グレーシア乳剤		○	○			○			○		○		○							
		ブロフラニリド	ブロフレアSC		○	○				○													ミツバチに対して影響あり
	UN	ピリダリル	プレオフロアブル		○								○										
	34	フロメトキン	アベンジャーフロアブル							○		○											
	34	フロメトキン	ファインセーブフロアブル(劇)							○		○											
定植後・無人航空機・殺虫剤																							
	3A	エトフェンプロックス	トレボンエアー		○																		ミツバチに対して影響あり
	4A	ジノテフラン	スタークル液剤10									○											
	6	エマメクチン安息香酸塩	アファーム乳剤						○			○											
	22A	インドキサカルブ	トルネードエースDF		○																		ミツバチ及びマルハナバチに対して影響あり
	22B	メタフルミゾン	アクセルフロアブル		○																		
	28	テトラニリプロール	ヨーバルフロアブル		○	○			○			○				○							ミツバチに対して影響あり
		フルベンジアミド	フェニックス顆粒水和剤		○	○																	
		シアントラニリプロール	ベネビアOD		○				○			○											ミツバチに対して影響あり
		クロラントラニリプロール	プレバソンフロアブル5		○	○			○														