除草1-1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
移植後施用																							
4・2・2	フロルピラウキシフェンベンジル・ペノキススラム・ペンゾビシクロン	ウィードコア200SD粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					移植後10日～ﾉﾋﾞｴ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○		○		
4・2・2	フロルピラウキシフェンベンジル・ペノキススラム・ペンゾビシクロン	ウィードコアジャンボSD	○	○	○	○	○	○	○			○	○					移植後10日～ﾉﾋﾞｴ4葉期(但し、収穫60日前まで)					
2・4	プロピリスルフロン・フロルピラウキシフェンベンジル	カチドキZ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植時（田植同時散布機で施用） 移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期(但し、移植後30日	○				
2・4	プロピリスルフロン・フロルピラウキシフェンベンジル	カチドキZ楽粒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○		
33・2・2	シクロピリモレート・トリアファモン・ピラゾレート	クサウェポン400FG	○	○	○	多年生雑草												移植後1日～ﾉﾋﾞｴ3葉期(但し、移植後30日まで)	○		○		
33・5・27・2	シクロピリモレート・シメトリン・テフリルトリオン・ペノキススラム	グランクロスSジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植後14日(稲4葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ4葉期(但し、収穫60日前まで)					
33・5・27・2	シクロピリモレート・シメトリン・テフリルトリオン・ペノキススラム	グランクロス1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植後14日(稲4葉期以降)～ﾉﾋﾞｴ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○				
15	イプフェンカルバゾン	スタメン1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○									移植時（田植同時散布機で施用） 移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期(但し、移植後30	○				
15	イプフェンカルバゾン	スタメンフロアブル	○	○	○	○												植代後～移植前7日又は移植当日～ﾉﾋﾞｴ1葉期(但し、移植後30日まで)	○				
30・27・2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレエアー粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後1日～ﾉﾋﾞｴ3葉期(但し、移植後30日まで)	○		○		
5・27・2・15	シメトリン・テフリルトリオン・トリアファモン・ベンフレセート	ノックアウト楽粒	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植後7日～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○		
1・4	シハロホップブチル・フロルピラウキシフェンベンジル	ノブレクト乳剤	○	○	○	○		○	○			○						移植後20日～ﾉﾋﾞｴ5葉期(但し、収穫45日前まで)					
6	ベンタゾンナトリウム塩	バサグラン・エアー1キロ粒剤			○	○	○	○	○	○	○							移植後15日～収穫45日前まで	○				
27・14・2	フェンキノトリオン・ベントキサゾン・メタゾスルフロン	流星エアー粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後3日～ﾉﾋﾞｴ3葉期(但し、移植後30日まで)	○				
30・30・4	オキサジクロメホン・ブロモブチド・フロルピラウキシフェンベンジル	ルンバ楽粒	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○					移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期(但し、移植後30日まで)	○	○	○		
15・14	ブタクロール・ベントキサゾン	サキドリEW	○	○	○	○	○		○	○				○				移植直後～ノビエ1葉期(但し、移植後30日まで)				○	・ホタルイ、ミズガヤツリに効果がやや劣る場合があるので、有効な後処理剤との体系処理で使用する。
15	プレチラクロール	エリジャン乳剤	○	○	○	○	○											移植直後～ノビエ1葉期（但し、移植後30日まで）				○	・植代時～移植前7日までの使用可。
5・27・15	シメトリン・ピラゾキシフェン・プレチラクロール	ワンオールS1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○				○	移植直後～ノビエ2葉期(但し、移植後30日まで)				○	・レンコン隣接田での使用可能。 ・減水深1.5cm/日以下（早期は1.0cm/日以下）で使用。 ・イネ1.5葉期までの使用が望ましい。
27・27・2	ピラゾレート・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	アールタイプ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・早期栽培、砂壌土では早い処理で薬害の恐れがあるので移植後3日以降に使用する。
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLX400FG	○	○	○	多年生広葉雑草												移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○		○	○	
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLX1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
2・14・0	イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
2・0・14	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル	サラブレッドKAIフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○	○		○	
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLXフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○	○		○	

除草1−1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生												薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○				○	
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	サラブレッドGO400FG（普）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○		○		・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	サラブレッドGOジャンボ（普）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○						・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	サラブレッドGOフロアブル（普）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○				・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
0・15・27・2	ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル	ラオウジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○					○	・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
0・15・27・2	ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル	ラオウフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○			○	・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
14・27・27	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン	イネキング1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					○	移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
14・27・27	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン	イネキングフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○						移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
2・15・27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草												○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
15・27・2	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
15・27・2	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空フロアブル	○	○	○	多年生広葉雑草													移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・移植3日後以降の使用を推奨する。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー豆つぶ250	○	○	○	多年生広葉雑草												○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、収穫60日まで）	○	○	○	○	
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、収穫60日まで）				○	
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラーフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）		○		○	
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラージャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
2・15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガン1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
14・2・0	ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド	アッパレZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
15・27・2	フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン	アカツキフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植後3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
0・14・2	ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン	銀河1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					移植直後～ノビエ3葉期（但し、収穫60日前まで）	○			○	
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
27・14・2	フェンキノトリオン、ペントキサゾン、メタゾスルフロン	流星1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・早期栽培では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・2・15・27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
15・27	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン	キマリテフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・早期栽培、砂壌土では早い処理で薬害の恐れがあるので移植後5日以降に使用する。

除草1-1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生												薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
15･0･2	カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン	月光1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
15･27･4	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・フロルピラウキシフェンベンジル	サキガケ楽粒	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						移植直後～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで）				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
2･27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				○	移植直後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
2･27･15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウン1キロ粒剤 カウンシルエナジー1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。
2･27･15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンフロアブル カウンシルエナジーフロアブル	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○	○		○	・後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。
2･27･15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンジャンボ カウンシルエナジージャンボ	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	・ノビエ3葉期までの使用を推奨する。 ・後作になす、たまねぎを、さやえんどうを栽培しない。
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティジャンボ	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ豆つぶ250	○	○	○	多年生雑草													移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○	○	○	○	
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○	○		○	
2･27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	
27･2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリート1キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 ・移植5日後からの使用を推奨する。
2･2･27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMX1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草													移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・移植3日後以降の使用を推奨する。
33･27･2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン	ウルティモZ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												○	移植直後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
2･14･27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4葉期（但し、移植後30日まで）	○	○		○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2･14･27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作になす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
2･14･27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4葉期（但し、移植後30日まで）				○	・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。 ・早期栽培ではノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。
2･14･27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラ400FG(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	移植直後～ノビエ4葉期(但し、移植後30日まで）				○	・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
14･27･27	ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビシクロン	イネキングジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○					○	移植後1日～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	
15･27･2	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空ジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草													移植後1日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	・移植3日後以降の使用を推奨する。
15･27･2	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空エアー粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草													移植後1日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○		○	○	・移植3日後以降の使用を推奨する。
2･15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガンジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植後3日～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	
2･15	ピリミスルファン・フェノキサスルホン	ガンガン豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植後3日～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	○	○	○	○	
15･0･2･27	カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン	シロノックLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	移植後3日～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	

除草1-1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
2･15･27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカクジャンボ	○	○	○	多年生雑草												移植3日後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
2･15･27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク豆つぶ250	○	○	○	多年生雑草												移植3日後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○	○	○	○	
14･2･0	ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド	アッパレZ400FG	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植3日後～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○		○	○	
27･14･2	フェンキノトリオン、ペントキサゾン、メタゾスルフロン	流星ジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草												移植3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
14･2･0	ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド	アッパレZジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植後3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
15･27･2	イプフェンカルバゾン・テフリルトリオン・プロピリスルフロン	カイリキZジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）		○		○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
27･14･2	フェンキノトリオン、ペントキサゾン、メタゾスルフロン	流星フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
14･2･0	ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド	アッパレZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	移植後3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）		○		○	
15･0･2	カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン	月光フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	○			○	
15･0･2	カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン	月光ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					移植後3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
2･2･15･27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植後3日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
2･2･27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMXジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草												移植3日後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	
2･2･27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMX豆つぶ250	○	○	○	多年生広葉雑草												移植3日後～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○		○	○	
15･4･2	インダノファン・クロメプロップ・ペンスルフロンメチル	マサカリLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	移植後5日～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	・移植後早い時期の処理で、高温が続く場合には一過性の生育抑制が発生する場合がある。
33･27･2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン	ウルティモZフロアブル	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植後5日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで）	○	○		○	・砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
33･27･2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン	ウルティモZジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後5日～ノビエ3葉期(但し、移植後30日まで）				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
0･14･2	ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン	銀河フロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後5日～ノビエ3葉期（但し、移植後30日まで）				○	
0･14･2	ダイムロン・ピラクロニル・メタゾスルフロン	銀河ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	移植後5日～ノビエ3葉期（但し、収穫60日前まで）				○	・コウキヤガラは草丈30cmまでの散布で、除草効果が高い。
27･2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリートフロアブル ボデーガードプロフロアブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		移植後5日～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）	○	○		○	・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
27･2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリートジャンボ ボデーガードプロジャンボ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		移植後5日～ノビエ3.5葉期（但し、移植後30日まで）				○	・ノビエ3葉期までの使用を推奨する。 ③後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
27･2･4	テフリルトリオン・トリアファモン・フロルピラウキシフェンベンジル	ストレングス1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			移植後5日～ノビエ4葉期(但し、移植後30日まで）	○			○	・早期栽培では薬害を生じる恐れがあるので使用を避ける。
4･2･27	フロルピラウキシフェンベンジル・ペノキススラム・ベンゾビシクロン	ウィードコア1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植後7日～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）	○			○	・移植後15日までの使用を推奨する。 ・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2･27･2	ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロン	アクシズMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後7日～ノビエ4葉期（但し、収穫45日前まで）	○			○	・ウリカワ多発田では効果の高い薬剤との体系処理が望ましい。

除草1−1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
2・2・27	アジムスルフロン・ペノキススラム・メソトリオン	アトカラSジャンボMX セカンドショットSジャンボMX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		移植後14日～ノビエ3.5葉期（但し、収穫45日前まで）					
0・14・27・2	ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	ゲパード1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後14日～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）	○			○	
0・14・27・2	ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	ゲパードジャンボ	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後14日～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）				○	
0・14・27・2	ダイムロン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	ゲパードエアー粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後14日～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）	○		○	○	
2	ピリミスルファン	アトトリ1キロ粒剤	○			多年生広葉雑草												移植後14日（イネ5葉期以降）～ノビエ4葉期（但し、収穫45日前まで）	○			○	
2	ピリミスルファン	アトトリ豆つぶ250	○			多年生広葉雑草												移植後14日（イネ5葉期以降）～ノビエ4葉期（但し、収穫45日前まで）	○			○	
5・0・27・2	シメタメトリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	レブラスエアー粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後14日～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）	○		○	○	
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植後14日（稲5葉期以降）～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）				○	・高温条件では薬害を生ずることがある。
5・2・27	ジメタメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン	ツイゲキ豆つぶ250	○	○	○	多年生広葉雑草											○	移植後14日（稲5葉期以降）～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）	○			○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
5・0・27・2	シメタメトリン・ダイムロン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	レブラス1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後14日～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）	○			○	
1	メタミホップ	トドメMF1キロ粒剤	○													○		移植後14日～ノビエ5葉期まで(但し、収穫50日前まで）	○			○	
1	メタミホップ	トドメMF乳剤	○													○		移植後14日～ノビエ7葉期まで(但し、収穫50日前まで）				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
1・5・2・27	シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロンメチル・ベンゾビシクロン	ハイカット1キロ粒剤 サンパンチ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草										○	○	移植後15日～ノビエ3.5葉期（但し、収穫60日前まで）	○			○	・体系処理の後処理剤として使用する。 ・クログワイ、オモダカ対策の体系処理剤として有効
2・27	ペノキススラム・ベンゾビシクロン	テッケン1キロ粒剤 ニトウリュウ1キロ粒剤	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後15日～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）	○			○	
27・2	テフリルトリオン・ペノキススラム	ワイドショット1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					移植後15日～ノビエ4葉期（但し、収穫45日前まで）	○				
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○															移植後15日～ノビエ4葉期（但し、収穫45日前まで）	○			○	・ノビエの2葉期から4葉期が使用適期 ・処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ・移植前後の初期除草剤との体系で使用する。
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン豆つぶ250	○															移植後15日～ノビエ4葉期（但し、収穫45日前まで）	○		○	○	
2・6	ピリミノバックメチル・ベンタゾン粒	ヒエクリーンバサグラン粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○							移植後15日～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）				○	・ノビエの2葉期から4葉期が使用適期 ・ピリミノバックメチルは湛水が必要だが、ベンタゾンは水溶性が高いので確実に止水する（水口・水尻をしっかりと止める）。深水にすると効果が落ちる。 ・散布後7日間は落水、かけ流しをしない。 ・散布後2日以内の降雨で効果が十分に得られない場合があるので、天候に注意する。 ・漏水田などでは使用しない。
0・2	ダイムロン・ペノキススラム	ワイドアタックD1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				移植後15日～ノビエ5葉期（イネ4葉期以降）（但し、収穫60日前まで）	○			○	・初期剤、一発処理剤との体系で使用する。 ・落水することなく、湛水状態のままで散布する。
6	ベンタゾンナトリウム塩	バサグラン液剤（ナトリウム塩）			○	○	○	○	○	○	○			○				移植後15～55日（但し収穫50日前まで） 移植後15日～収穫45日前まで				○	・落水又は極浅水（雑草が水面上）にして散布し、散布後3～4日は入水、落水はしない。 ・処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になる。 ・ベンタゾンの薬害注意、DCPA剤との近接散布は避ける。

除草1−1移植水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											薬類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
2	ペノキススラム	ワイドアタックSC	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後20日(ｲﾈ5葉期以降)～ノビエ6葉期(但し、収穫30日前まで)				○	・前処理剤との体系で使用する。 ・展着剤は加用しない。 ・散布後2日間は入水、落水、かけ流しはしない。 ・ｲﾎﾞｸｻ、ﾋﾒﾐｿﾊｷﾞ、ｱｾﾞｶﾞﾔ、ﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ等には効果が低い。
1	シハロホップブチル	クリンチャー1キロ粒剤	○													○		①移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫30日前まで) ②移植後25日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)	○			○	・処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ・アゼガヤに適用あり、草丈20cmまでに散布する。
1	シハロホップブチル	クリンチャージャンボ	○													○		①移植後7日～ノビエ4葉期(但し、収穫30日前まで) ②移植後25日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)				○	・アゼガヤに適用あり、草丈20cmまでに散布する。
1・6	シハロホップブチル・ベンタゾン	クリンチャーバスME液剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		移植後15日～ノビエ5葉期(但し、収穫50日前まで)				○	
6・1	ベンタゾン・メタミホップ	トドメバスMF液剤	○	○	○	多年生雑草												移植後15日～ノビエ6葉期まで(但し、収穫50日前まで)				○	・早期栽培、砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
1	シハロホップブチル	クリンチャーEW	○													○		移植後20日～ノビエ6葉期(但し、収穫30日前まで)				○	・散布薬液は使用当日に調製し、展着剤を加用する。 ・アゼガヤに適用あり、草丈60cmまでに散布する。
4	フロルピラウキシフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○		○	○		○	○		○	○						移植後20日～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで)				○	・幼穂形成期以降の散布では葉先の黄化や止葉の下垂が生じることがある。 ・いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがある。
2・2	ハロスルフロンメチル・メタゾスルフロン	アレイルSC	○	○	○	多年生広葉雑草												移植後20日～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで) ※出穂始期15日前まで				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
4	2，4－PA	粒状水中2，4－D			イネ科以外の水田雑草													有効分げつ終止期～幼穂形成期前(但し収穫60日前まで)					・雑草が水面下にかくれるくらいまでに湛水して散布し、散布後2～3日は落水しない。
0	ACN	モゲトン粒剤						○					○				○	雑草種により使用時期が異なる	○	○		○	・極端な砂質土(漏水田)では使用しない。 ・極端な深水で使用すると薬害を生ずることがある。 ・ウキクサ類に適用あり。 ・水口施用は藻類・表層剥離で適用。
2	ビスピリバックナトリウム塩	ノミニー液剤	クサネム・イボクサ															移植後30日～ｸｻﾈﾑの草丈40cmまで 移植後30日～ｲﾎﾞｸｻの茎長30cmまで(但し、収穫60日前まで)				○	・茎葉処理剤。 ・湛水状態またはごく浅水状態にして、雑草の茎葉全体に薬剤が付着するようにする。 ・3日以上落水(浅水)状態を保つ。 ・クサネムとイボクサ対策に使用。 ・クサネムは再生する場合があるが着莢が減少する。 ・イボクサは本田内で再生し、伸長を始めた時期に散布する。
27・2	フロルピラウキシフェンベンジル	カウンシルコンプリート1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草																	播種直後～ノビエ3.5葉期、ただし移植30日
	フロルピラウキシフェンベンジル	ボデーガードプロ1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草																	播種直後～ノビエ3.5葉期、ただし移植30日