除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生												藻類・表層剥離	使用時期	WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ				
は種前施用																					
9	グリホサートカリウム塩	ラウンドアップマックスロード	○	○	○	多年生雑草													①耕起前（雑草生育期） ②は種30日前～出芽前（雑草生育期）（乾田不耕起栽培） ③耕起直後～出芽前（雑草生育期）（乾田耕起栽培）	○	
9	グリホサートイソプロピルアミン塩	草枯らし	○	○	○	多年生雑草													①耕起20～10日前（雑草生育期）1年生雑草のみ ②耕起直後～出芽前（雑草生育期）（乾田耕起栽培） ③ は種30日前～出芽前（雑草生育期）（乾田不耕起栽培）	○	・雑草茎葉散布 ・汎用除草剤の項参照
9	グリホサートカリウム塩	タッチダウンiQ	○	○	○														①耕起前（雑草生育期） ②播種30日前～出芽前（雑草生育期）（乾田不耕起栽培）	○	
9・14	グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル	サンダーボルト007	○	○	○														耕起20～10日前（雑草生育期）		
22・22	ジクワット・パラコート	プリグロックスL(毒)	○	○	○														秋期稲刈取後又は春期水田耕起1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、播種前14日～播種後7日（稲出芽前）	○	
27・27	ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン	プレキープ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○						湛水直播の代かき後～は種7日前又はは種直後～ノビエ1葉期（但し、収穫90日前まで）	○	・湛水散布又は無人航空機による散布
は種時施用（は種同時散布機で施用）																					
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					○	は種時	○	
2・2・27	イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	マスラオ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					○	は種時	○	
2・27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○						は種時	○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリート1キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○						は種時	○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎおよびさやえんどうを栽培しない。
27・27	ピラゾキシフェン・ベンゾビシクロン	プレキープ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○						は種時	○	
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○																は種時	○	・散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。
2・27	ピリフタリド・ベンゾビシクロン	アピロファースト1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○										湛水直播のは種時		
27・2	フロルピラウキシフェンベンジル	カウンシルコンプリート1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○						は種時		
	フロルピラウキシフェンベンジル	ボデーガードプロ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○						は種時		