除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
播種後施用																							
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					稲5葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○				
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン	ツイゲキ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					稲5葉期～ﾉﾋﾞｴ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○				
5・27・2・15	シメトリン・テフリルトリオン・トリアファモン・ベンフレセート	ノックアウト楽粒	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○				
1・4	シハロホップブチル・フロルピラウキシフェンベンジル	ノブレクト乳剤	○	○	○			○	○			○						稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ5葉期(但し、収穫45日前まで)					
2・27	ピリフタリド・ベンゾビシクロン	アピロファースト1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○									湛水直播のは種直後～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○				
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン1キロ粒剤 ワンステージ1キロ粒剤	○															は種直後～稲出芽前				○	・ノビエの発生前～4葉期まで有効なので時期を失しないように散布する。 ・散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。 ・落水後、土壌が落ち着いたら散布する。
			○															イネ3葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	・ノビエの発生前～5葉期まで有効なので時期を失しないように散布する。 ・散布後数日間著しい高温が続く場合、初期生育が抑制されることがある。
15	ベンチオカーブ	サターン乳剤	○	○	○	○												①は種直後～稲出芽前(入水15日前まで) ②稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ1.5葉期(但し、収穫90日前まで)(入水15日前まで)					
2・14・0	イマゾスルフロン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽始期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・出芽揃以降の使用を推奨する。
2・2・27	イマゾスルフロン・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	マスラオ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	は種直後～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	
2・27	ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	ベルーガ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)	○			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫60日前まで)				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラーフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる可能性があるため、稲1葉期～ノビエ3葉期までの使用を推奨する。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラージャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
14・2・27	ピラクロニル・ピリミノバックメチル・フェンキノトリオン	エンペラー豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ出芽揃期～ノビエ3葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27	トリアファモン・フェンキノトリオン	プライオリティ豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ出芽揃期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリート1キロ粒剤 ボデーガードプロ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					は種直後～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリートフロアブル ボデーガードプロフロアブル	○	○	○	○	○	○	○				○					は種直後～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○	○		○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリートジャンボ ボデーガードプロジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・後作物としてなす、たまねぎ、さやえんどうを栽培しない。

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
14・0・2・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ブロモブチド・ピラクロニル	サラブレッドGOフロアブル(普)	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○	○			・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
14・0・2・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ブロモブチド・ピラクロニル	サラブレッドGOジャンボ(普)	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)					・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
14・0・2・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ブロモブチド・ピラクロニル	サラブレッドGO400FG(普)	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○	イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○		・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLXフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	
0・15・27・2	ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル	ラオウ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・15・27・2	ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル	ラオウジャンボ	○	○	○		○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	
0・15・27・2	ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル	ラオウフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
33・27・2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン	ウルティモZ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○					イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
15・0・2・27	カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン	シロノックLフロアブル	○	○	○	○	○	○	○									イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・0・2・27	カフェンストロール・ダイムロン・ベンスルフロンメチル・ベンゾビシクロン	シロノックLジャンボ	○	○	○	○	○	○	○									イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・0・14・0	イマゾスルフロン・オキサジクロメホン・ピラクロニル・ブロモブチド	バッチリLX400FG	○	○	○	○	○	○	○			○						イネ1葉期～ノビエ2.5葉期(但し、収穫90日まで)	○		○	○	
2・15・27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・15・27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカクジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・15・27	ピリミスルファン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン	ベッカク豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫75日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・27・15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウン1キロ粒剤 カウンシルエナジー1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・27・15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンジャンボ カウンシルエナジージャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・2・15・27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
2・2・15・27	ピラゾスルフロンエチル・ピリフタリド・プレチラクロール・メソトリオン	アピログロウMXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
15・27・2	フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン	天空エアー粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2	オキサジクロメホン・テフリルトリオン・メタゾスルフロン	ディオーレ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
14・2・0	ピラクロニル・プロピリスルフロン・ブロモブチド	アッパレZ400FG	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○	○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
27・14・2	フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン	流星1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
27・14・2	フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン	流星フロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・14・2	フェンキノトリオン・ペントキサゾン・メタゾスルフロン	流星ジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・2・27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMXジャンボ	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	
2・2・27	ピリフタリド・ピリミスルファン・メソトリオン	ジャンダルムMX豆つぶ250	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○		○	○	
2・27・15	トリアファモン・フェンキノトリオン・フェントラザミド	カウントダウンフロアブル カウンシルエナジーフロアブル	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
0・27・2・0	オキサジクロメホン・フェンキノトリオン・プロピリスルフロン・ブロモブチド	シンズイZジャンボ	○	○	○		○	○	○			○	○					イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
33・27・2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン	ウルティモZジャンボ	○	○	○	○	○	○	○				○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土ではイネ2葉期以降の使用を推奨する。
33・27・2	シクロピリモレート・ピラゾレート・プロピリスルフロン	ウルティモZフロアブル	○	○	○	○	○	○	○				○					イネ1葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土ではイネ3葉期以降の使用を推奨する。
2・27・2	ピリフタリド・メソトリオン・メタゾスルフロン	アクシズMX1キロ粒剤	○	○	○	○	○		○			○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラフロアブル(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)	○	○			・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラ1キロ粒剤(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)	○				・稲1葉期～ノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラジャンボ(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)					・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。 ・イネ1葉期～ﾉﾋﾞｴ3.5葉期までの使用を推奨する。
2・14・27	トリアファモン・ピラクロニル・ベンゾビシクロン	アシュラ400FG(普)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)					・稲1葉期～ノビエ3.5葉期までの使用を推奨する。
27・2・4	テフリルトリオン・トリアファモン・フロルピラウキシフェンベンジル	ストレングス1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ1葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫90日前まで)	○			○	・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2	ピリミノバックメチル	ヒエクリーン豆つぶ250	○															イネ3葉期～ノビエ3葉期(但し、収穫45日前まで)	○			○	・稲の根が露出している条件では薬害を生ずる場合がある。
1・5・2・27	シハロホップブチル・ジメタメトリン・ハロスルフロンメチル・ベンゾビシクロン	ハイカット1キロ粒剤 サンバンチ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○					イネ3葉期～ノビエ3.5葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	・初期剤、一発処理剤との体系で使用する。 ・稲の根が露出している条件では薬害を生ずる場合がある。
4・2・27	フロルピラウキシフェンベンジル・ペノキススラム・ベンゾビシクロン	ウィードコア1キロ粒剤	○	○	○		○	○	○			○	○					イネ3葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2	ペノキススラム	ワイドアタックSC	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)				○	・前処理剤との体系で使用する。 ・展着剤は加用しない。 ・散布後2日間は入水、落水、かけ流しはしない。 ・ｲﾎﾞｸｻ、ﾋﾒﾐｿﾊｷﾞ、ｱｾﾞｶﾔ、ﾁｮｳｼﾞﾀﾃﾞ等には効果が低い。
4	フロルピラウキシフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○		○			○	○			○						イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫45日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
0・2	ダイムロン・ペノキススラム	ワイドアタックD1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ3葉期～ノビエ5葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	
33・27	シクロピリモレート・テフリルトリオン	ルナクロス1キロ粒剤		○	○		○	○	○									イネ3葉期～出芽後50日(但し、収穫45日前まで)	○				・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
1	メタミホップ	トドメMF1キロ粒剤	○															イネ3.5葉期～ノビエ4葉期まで(但し、収穫50日前まで)	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
27・2	テフリルトリオン・ペノキススラム	ワイドショット1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫45日前まで)	○				
2・27	ペノキススラム・ベンゾビシクロン	テッケン1キロ粒剤 ニトウリュウ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○				○					イネ4葉期～ノビエ4葉期(但し、収穫60日前まで)	○			○	

除草1-2.直播水稲除草剤

HRACコード	成分名	商品名	一年生			多年生											藻類・表層剥離	使用時期	他の使用方法			WCS用イネに使用可	備　考
			ノビエ	一年生イネ科雑草	一年生広葉雑草	マツバイ	ホタルイ	ウリカワ	ミズガヤツリ	クログワイ	オモダカ	セリ	ヒルムシロ	コウキヤガラ	多年生イネ科雑草	キシュウスズメノヒエ			無人航空機	水口施用	湛水周縁散布		
2・2・27	アジムスルフロン・ペノキススラム・メソトリオン	アトカラSジャンボMX セカンドショットSジャンボMX	○	○	○	○	○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ4葉期（但し、収穫45日前まで）					
2・2	ハロスルフロンメチル・メタゾスルフロン	アレイルSC	○	○	○		○	○	○			○	○					イネ4葉期～ノビエ5葉期（但し、収穫45日前まで） ※出穂始期15日前まで					・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
5・2・27	シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン	ツイゲキ1キロ粒剤	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					イネ5葉期～ノビエ4葉期（但し、収穫60日前まで）				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2	ピリミスルファン	アトトリ1キロ粒剤								○	○							イネ5葉期～収穫45日前まで	○			○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。 ・砂壌土では薬害を生ずる恐れがあるので使用を避ける。
2	ピリミスルファン	アトトリ豆つぶ250								○	○							イネ5葉期～収穫45日前まで	○			○	
1	シハロホップブチル	クリンチャー1キロ粒剤	○															①は種後10日～ノビエ3葉期(但し、収穫30日前まで) ②は種後25日～ノビエ4葉期まで(但し、収穫30日前まで)	○			○	・処理時には3～5cmの湛水を保ち止水する。 ・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
1	シハロホップブチル	クリンチャージャンボ	○															は種後10日～ノビエ3葉期(但し、収穫30日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
1	シハロホップブチル	クリンチャーEW		○														は種後10日～ノビエ5葉期(但し、収穫30日前まで)	○			○	・落水状態で散布する。 ・広葉雑草が多い場合には、有効な剤と組み合わせて使用する。
1・6	シハロホップブチル・ペンタゾンナトリウム塩	クリンチャーバスME液剤	○	○	○	○	○	○	○									は種後10日～ノビエ5葉期(但し、収穫50日前まで)				○	・散布液は使用当日に調製する。 ・重複散布を避ける。 ・高温が予想される時の使用は避ける。 ・展着剤は加用しない。 ・他剤とは混用しない。DCPA剤との近接散布は避ける。 ・効果が現れるまで10～14日要するので、誤まって散き直しをしない。
6・1	ベンタゾン・メタミホップ	トドメバスMF液剤	○	○	○	○	○	○	○									は種後10日～ノビエ6葉期まで(但し、収穫50日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
1	メタミホップ	トドメMF乳剤	○															は種後10日～ノビエ6葉期まで(但し、収穫50日前まで)				○	・稲の根が露出する条件では薬害を生ずる場合がある。
6	ベンタゾンナトリウム塩	バサグラン液剤（ナトリウム塩）			○	○	○	○	○	○	○							は種後35～50日(但し、収穫50日前まで) は種後35日～収穫45日前まで				○	
4	フロルピラウキシフェンベンジル	ロイヤント乳剤	○		○			○	○			○						稲3葉期～ノビエ5葉期（但し、収穫45日前まで）					オオクサキビに除草効果
27・2	テフリルトリオン・トリアファモン	カウンシルコンプリート1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草												播種直後～ノビエ3.5葉期、ただし移植30日					
	テフリルトリオン・トリアファモン	ボデーガードプロ1キロ粒剤	○	○	○	多年生雑草												播種直後～ノビエ3.5葉期、ただし移植30日					