除草2-3. 大麦除草剤

HRACコード	成分名	商品名	多年生雑草	一年生雑草	一年生雑草（ツユクサ、カヤツリグサ、キク・アブラナ科を除く）	一年生雑草（イネ科を除く）	一年生広葉雑草	スズメノテッポウ	県推奨使用時期	備考
9	グリホサートカリウム塩	タッチダウンiQ(普)		○					耕起又はは種前（雑草生育期） は種後出芽前（雑草生育期）	汎用除草剤の項参照
10	グルホシネートPナトリウム塩	ザクサ液剤		○					耕起又はは種前(雑草生育期) 収穫7日前まで(雑草生育期)	
14	ピラフルフェンエチル	エコパートフロアブル					○		大麦節間伸長開始期まで(広葉雑草2～4葉期)(但し、収穫45日前まで)	
15	プロスルホカルブ	ボクサー(普)		○					は種後～麦2葉期（雑草発生前～発生始期）	
5 15	プロメトリン・ベンチオカーブ	サターンバアロ粒剤(普)		○					は種後～出芽前(雑草発生前) 生育初期（大麦の4葉期まで、ｽｽﾞﾒﾉﾃｯﾎﾟｳ1.5葉期まで）	砂壌土では薬害を生じる恐れがあるので、下限薬量で使用する。
12 15	ジフルフェニカン・フルフェナセット	リベレーターG(普)		○					は種後～麦2葉期（雑草発生前～ｲﾈ科雑草1葉期まで）	砂質土壌での使用は薬害を生じる恐れがあるので避ける。
12 15	ジフルフェニカン・フルフェナセット	リベレーターフロアブル(普)		○					は種後～麦3葉期（雑草発生前～ｲﾈ科雑草1葉期まで）	①出芽期の使用では、高薬量で薬害を生じる場合があるので注意する。 ②砂質土壌での使用は薬害を生じる恐れがあるので避ける。
15 5	プロスルホカルブ・リニュロン	ムギレンジャー乳剤(普)		○					は種後出芽前(雑草発生前)	小麦除草剤の項参照 ※　少量散布の場合は専用ノズルを使用し、土壌の全面に均一に散布すること。
15 5	プロスルホカルブ・リニュロン	キックボクサー細粒剤F		○					は種後出芽前(雑草発生前)	
15 3 5	ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン	クリアターン乳剤(普)		○					は種直後(雑草発生前)	小麦除草剤の項参照