

平成26年10月17日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第13175号	ホクコーオトルン水和剤	アセフェート水和剤	北興化学工業株式会社
第19992号	オトルン水和剤	アセフェート水和剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第19566号	家庭園芸用ホクコーオトルン水和剤	アセフェート水和剤	北興化学工業株式会社
第21519号	家庭園芸用オトルン水和剤	アセフェート水和剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第21819号	家庭園芸用GFオトルン水和剤	アセフェート水和剤	住友化学園芸株式会社
第13177号	ホクコーオトルン粒剤	アセフェート粒剤	北興化学工業株式会社
第19993号	オトルン粒剤	アセフェート粒剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第19568号	家庭園芸用ホクコーオトルン粒剤	アセフェート粒剤	北興化学工業株式会社
第21520号	家庭園芸用オトルン粒剤	アセフェート粒剤	アリスタ ライフサイエンス株式会社
第21789号	家庭園芸用GFオトルン粒剤	アセフェート粒剤	住友化学園芸株式会社
第21733号	オトルンDX粒剤	アセフェート・クロチアニジン粒剤	住友化学園芸株式会社

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかるところのみ）】

1) アセフェート水和剤

（第13175号 ホクコーオトルン水和剤、第19992号 オトルン水和剤）

- ①作物名「なす」を削除する。
- ②作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ③作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500倍又は1000～2000倍」を「1500倍又は1500～2000倍」、「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」、「3回以内」から「1回」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

- ④作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更する。
- ⑤作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑥作物名「だいこん」を削除する。
- ⑦作物名「はつかだいこん」を削除する。
- ⑧作物名「非結球あぶらな科葉菜類（ケール、からしな、みずな、ルッコラを除く）」を「非結球あぶらな科葉菜類（ケール、からしな、みずな、ルッコラ、たかなを除く）」に変更する。
- ⑨作物名「かぶ」を削除する。
- ⑩作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、「4 回以内」から「2 回以内」及び「5 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内）」から「3 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。
- ⑪作物名「トマト」及び「ミニトマト」を削除する。
- ⑫作物名「とうもろこし」を「未成熟とうもろこし」に変更する。
- ⑬作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 30 日前まで」から「収穫 60 日前まで」、「2 回以内」から「1 回」及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑭作物名「かき」の「適用病害虫名」の「カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、カキノヘタムシガ」の「希釈倍数」を「1000~1500 倍」から「1500 倍」に変更し、「適用病害虫名」の「フジコナカイガラムシ」の「希釈倍数」を「1000 倍」から「1500 倍」に変更し、「適用病害虫名」の「カキノヒメヨコバイ」を削除する。
- ⑮作物名「かんきつ」を削除する。
- ⑯作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採 30 日前まで」から「摘採 45 日前まで」、「2 回以内」から「1 回」及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑰作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫 7 日前まで」から「収穫開始 7 日前まで」に変更する。

2) アセフェート水和剤（家庭園芸用）

（第 19566 号 家庭園芸用ホクローオトルン水和剤、第 21519 号 家庭園芸用オトルン水和剤、第 21819 号 家庭園芸用 G F オトルン水和剤）

- ①作物名「なす」を削除する。
- ②作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、「3 回以内」から「1 回」及び「3 回以内」から「2 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内）」に変更する。
- ③作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000~1500 倍又は 1000~2000 倍」を「1500 倍又は 1500~2000 倍」、「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」、「3 回以内」から「1 回」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ④作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更する。
- ⑤作物名「ブロッコリー」を削除する。

- ⑥作物名「だいこん」を削除する。
- ⑦作物名「はつかだいこん」を削除する。
- ⑧作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」、「4回以内」から「2回以内」及び「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ⑨作物名「トマト」及び「ミニトマト」を削除する。
- ⑩作物名「とうもろこし」を「未成熟とうもろこし」に変更する。
- ⑪作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫30日前まで」から「収穫60日前まで」、「2回以内」から「1回」及び「2回以内」から「1回」に変更する。
- ⑫作物名「かき」の「適用病害虫名」の「カキクダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、カキノヘタムシガ」の「希釈倍数」を「1000~1500倍」から「1500倍」に変更し、「適用病害虫名」の「カキノヒメヨコバイ」を削除する。
- ⑬作物名「かんきつ」を削除する。
- ⑭作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫7日前まで」から「収穫開始7日前まで」に変更する。

3) アセフェート粒剤

(第13177号 ホクコーオ尔特ラン粒剤、第19993号 オ尔特ラン粒剤)

- ①作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫21日前まで」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時植穴散布及び生育期葉面散布」から「植穴処理」及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- ②作物名「トマト」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ③作物名「ミニトマト」を削除する。
- ④作物名「きゅうり、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑤作物名「ピーマン」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日まで」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「株元散布」及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- ⑥作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫21日前まで」から「定植時」、「3回以内」から「1回」、「植穴散布及び生育期株元散布」から「植穴処理」及び「3回以内」から「1回」に変更する。

- ⑦作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 14 日前まで」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑧作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」及び「2 回以内（は種前及びは種時の処理は合計 1 回以内）」から「1 回」に変更する。
- ⑨作物名「はつかだいこん」を削除する。
- ⑩作物名「かぶ」の「使用時期」を「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に変更する。
- ⑪作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内）」から「3 回以内（植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内）」に変更する。

4) アセフェート粒剤（家庭園芸用）

（第 19568 号 家庭園芸用ホクコーオムラン粒剤、第 21520 号 家庭園芸用オムラン粒剤、第 21789 号 家庭園芸用 G F オムラン粒剤）

- ①作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 21 日前までの生育期」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時植穴散布及び生育期葉面散布」から「植穴処理」及び「3 回以内」から「2 回以内（定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内）」に変更する。
- ②作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 21 日前までの生育期」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「植穴散布及び生育期株元散布」から「植穴処理」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ③作物名「トマト」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「植溝散布又は植穴処理」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ④作物名「ミニトマト」を削除する。
- ⑤作物名「きゅうり、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「植溝散布又は植穴処理」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑥作物名「ピーマン」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫前日までの生育期」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」、「定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布」から「株元散布」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑦作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び収穫 14 日前までの生育期」から「定植時」、「3 回以内」から「1 回」及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ⑧作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は

種前植溝散布」から「植溝散布」及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。

⑨作物名「はつかだいこん」を削除する。

⑩作物名「かぶ」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に変更する。

⑪作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

5) アセフェート・クロチアニジン粒剤（第21733号 オルランDX粒剤）

作物名「トマト、なす、きゅうり」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「3回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1) アセフェート水和剤

（第13175号 ホクコーオ尔特ラン水和剤、第19992号 オ尔特ラン水和剤）

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
なす	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000倍	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000倍					
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキリンウバ	1000～1500倍	収穫14日前まで	2回以内			2回以内 (は種前及びは種時の処理は合計1回以内)
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1000～2000倍					2回以内 (は種前の処理は1回以内)
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～1500倍	収穫21日前まで	1回			1回
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1000～2000倍					
レタス	ヨトウムシ	1000～1500倍	収穫7日前まで	4回以内			10a 当り 25L 散布
ブロッコリー	オオタバコガ	1000倍					
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダコソシンクイムシ	1500倍	収穫前日まで	3回以内			3回以内
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1500～2000倍					
はつかだいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダコソシンクイムシ	1500倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
	アオムシ、コガ、アブラムシ類	1500～2000倍					
非結球 あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、 みずな、ルッコラを 除く)	アブラムシ類	1500倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
かぶ	アブラムシ類、アオムシ、コガ						
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000倍	収穫7日前まで	4回以内	10a 当り 25L 散布		
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ	1000倍					
	アブラムシ類	300倍					
トマト	アブラムシ類	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	3回以内		
	マメハモグリバエ	1000倍					
ミニトマト	アブラムシ類	1500倍	収穫14日前まで	1回	2回以内 (定植時の処理は1回以内、定植後は1回以内)		
とうもろこし		1000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内		
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500～2000倍	収穫30日前まで				
	ハマキムシ類	1500倍					
かき	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハタムシガ	1000～1500倍	収穫45日前まで	2回以内	2回以内		
	カキノヒメヨコバイ アジコカカガラムシ	1000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数
かんきつ	コクモンハマキ、シャクトリムシ類 ヤノカイガラムシ第1世代 ツノウムシ、ルビローウムシ ミカンキイロアザミウマ ネキアザミウマ コホウノミドリヒメコバエ	1000倍	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類、ケジキスイ類 コアオハナムグリ、アザミウマ類	1000～1500倍				
	ミカントゲコナジラミ	1500～2000倍				
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバエ	1000～2000倍	摘採30日前まで	2回以内		2回以内
	チャノコクモンハマキ	1000～1500倍				

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキシンウバ	1000～1500倍	100～300 L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)	
	アオムシ、コナガ アブラムシ類	1000～2000倍						
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500倍						
	アオムシ、コナガ アブラムシ類	1500～2000倍						
レタス	ヨトウムシ	1000～1500倍						
	オオタバコガ	1000倍						
非結球あぶらな 科葉菜類(ケール、 からしな、みずな、 ルッコラ、たかなを除く)	アブラムシ類	1500倍		収穫21日前まで	1回		1回	
オクラ	アブラムシ類 ミドリコバエ	1000倍		収穫開始 7日前まで				
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ			25L/10a	収穫30日前まで		2回以内	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
	アブラムシ類 ジャガイモガ	300倍 1000～1500倍						
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで		2回以内		
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメコバエ ハマキムシ類	1500～2000倍	200～700 L/10a	収穫60日前まで	1回	1回		
	カキタアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキハタムシガ フジコナカイガラムシ	1500倍						
かき	カキタアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキハタムシガ フジコナカイガラムシ	1500倍		収穫45日前まで	2回以内	2回以内		
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバエ	1000～2000倍	200～400 L/10a	摘採45日前まで	1回	1回		
	チャノコクモンハマキ	1000～1500倍						

2) アセフェート水和剤(家庭園芸用)

(第19566号 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン水和剤、第21519号 家庭園芸用オ
 ルトラン水和剤、第21819号 家庭園芸用GFオ尔特ラン水和剤)

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数	
なす	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000倍	収穫7日 前まで	3回以内	散布	3回以内	
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000倍					
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキシンウバ	1000～1500倍	収穫14日 前まで	2回以内			2回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計1回以内)
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1000～2000倍					
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000～1500倍	収穫14日 前まで	2回以内			2回以内 (は種前の処理は 1回以内)
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1000～2000倍					
レタス	ヨトウムシ	1000～1500倍	収穫14日 前まで	2回以内			2回以内 (は種前の処理は 1回以内)
ブロッコリー	オオタバコガ	1000倍					
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダニオンシンクイムシ	1500倍	収穫7日 前まで	4回以内			5回以内 (植付時の処理は 1回以内、植付後は 4回以内)
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1500～2000倍					
はつかだいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ ダニオンシンクイムシ	1500倍	収穫7日 前まで	4回以内	3回以内		
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1500～2000倍					
ばれいしょ	ヨトウムシ テントウムシダマシ幼虫	1000倍	収穫7日 前まで	4回以内	2回以内 (定植時の処理は 1回以内、定植後は 1回以内)		
	アブラムシ類、シヤガバネガ	1000～1500倍					
トマト	アブラムシ類	1000～2000倍	収穫前日 まで	3回以内	1回		
	マメハモグリバエ	1000倍					
ミニトマト	アブラムシ類	1500倍	収穫14日 前まで	1回	1回		
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000倍	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内		
とうもろこし	アブラムシ類		収穫30日 前まで				
ぶどう	チャノキアザミウマ フタデヒメヨコバイ	1500～2000倍	収穫30日 前まで	2回以内	2回以内		
	ハマキムシ類*	1500倍					
かき	カキタアザミウマ チャノキアザミウマ カキハナムシガ	1000～1500倍	収穫45日 前まで	3回以内	3回以内		
	カキヒメヨコバイ	1000倍					
かんきつ	コカモンハマキ、シヤクトリムシ類 ヤノハハラムシ第1世代 ツノロウムシ、ルビローウムシ ミカンキアザミウマ ネギアザミウマ ゴボウノミドリヒメヨコバイ	1000倍	収穫30日 前まで	3回以内	3回以内		
	アブラムシ類、ケシキスイ類 コアハナムグリ、アザミウマ類	1000～1500倍					
	ミカンゲコソジラミ	1500～2000倍					

*: 但し、登録番号21519号 家庭園芸用オ尔特ラン水和剤には「ぶどう」の適用病害虫「ハマキムシ類」の登録はありません。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマキシンウバ	1000～1500 倍	100～300 mL/m ²	収穫 30 日 前まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内)		
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1000～2000 倍							
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500 倍			1000～1500 倍		3 回以内	1 回	
	アオムシ、コカガ、アブラムシ類	1500～2000 倍							
レタス	ヨトウムシ	1000～1500 倍			1000 倍		2 回以内	3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)	
	オオタバコガ	1000 倍							
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫 ヨトウムシ	1000 倍			1000～1500 倍		1 回	1 回	
	アブラムシ類、ジャガイモガ	1000～1500 倍							
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000 倍			200～700 mL/m ²		収穫開始 7 日前まで	2 回以内	2 回以内
未成熟 とうもろこし	アブラムシ類								
ぶどう	チャノキロアサミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500～2000 倍	200～700 mL/m ²	収穫 60 日 前まで	1 回	1 回			
	ハマキムシ類*	1500 倍							
かき	カキクダアサミウマ チャノキロアサミウマ カキノハタムシガ	1500 倍	200～700 mL/m ²	収穫 45 日 前まで	2 回以内	2 回以内			

*：但し、登録番号 21519 号家庭園芸用オルトラン水和剤には「ぶどう」の適用病害虫「ハマキムシ類」の登録はありません。

3) アセフェート粒剤

(第 13177 号 ホクコーオ尔特ラン粒剤、第 19993 号 オ尔特ラン粒剤)

[変更前]

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫 21 日前まで	3 回以内	定植時植穴散布 及び生育期葉面 散布	3 回以内
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	1 回	散布	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫前日まで	3 回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	2 回以内 (定植時の 処理は 1 回 以内、定植 後は 1 回以 内)
ミニトマト			定植時	1 回	定植時作条散布 又は植穴散布	
きゅうり なす			アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ	2g/株	定植時及び 収穫前日まで	
ピーマン	アブラムシ類					
はくさい	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時及び 収穫 21 日前まで	3 回以内	植穴散布及び 生育期株元散布	3 回以内
ブロッコリー	ヨウムシ	6kg/10a (2g/株)	定植時及び収穫 14 日前まで		株元散布	
だいこん	アオムシ、コガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1 回	は種前 作条散布	2 回以内 (は種前及 びは種時の 処理は合計 1 回以内)
はつかだいこん						2 回以内 (は種前の 処理は 1 回 以内)
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 14 日前まで	1 回	株元散布	1 回
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	植付時			作条散布

[変更後]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゼートを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)	
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布		
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1～2g/株)	定植時		1回	作条散布 又は植穴処理	1回
きゅうり なす	アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ						
ピーマン	アブラムシ類	2g/株				株元散布	
はくさい	アオムシ、コガ ヨウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1～2g/株)				植穴処理	
ブロッコリー	ヨウムシ	6kg/10a (2g/株)				株元散布	
だいこん	アオムシ、コガ アブラムシ類	3～4kg/10a				は種前	
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日 前まで		株元散布		
ばれいしょ		3～6kg/10a (1～2g/株)	植付時		作条散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)	

4) アセフェート粒剤 (家庭園芸用)

(第 19568 号 家庭園芸用ホクコーオ尔特ラン粒剤、第 21520 号 家庭園芸用オ尔特ラン粒剤、第 21789 号 家庭園芸用 G F オ尔特ラン粒剤)

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3~6g/m ² (1株当たり1~2g)	定植時及び収穫21日前までの生育期	3回以内	定植時植穴散布及び生育期葉面散布	3回以内
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	1回	散布	
はくさい	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3~6g/m ² (1株当たり1~2g)	定植時及び収穫21日前までの生育期	3回以内	植穴散布及び生育期株元散布	3回以内
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ		定植時及び収穫前日までの生育期		定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布	
ミニトマト			定植時	1回	定植時植溝又は植穴散布	2回以内 (定植時の処理は1回以内、定植後は1回以内)
きゅうり なす	アブラムシ類 アサシマ類 オンシツコナジラミ	1株当たり2g	定植時及び収穫前日までの生育期	3回以内	定植時植溝又は植穴散布、生育期株元散布	3回以内
ピーマン	アブラムシ類					
ブロッコリー	ヨトウムシ	6g/m ² (1株当たり2g)	定植時及び収穫14日前までの生育期	1回	株元散布	2回以内 (は種前及びは種時の処理は合計1回以内)
だいこん	アオムシ、コガネアブラムシ類	3~4g/m ²	は種前		は種前植溝散布	
はつかだいこん				2回以内 (は種前の処理は1回以内)		
かぶ	アブラムシ類	4g/m ²	収穫14日前まで	1回	株元散布	1回
ばれいしょ		3~6g/m ² (1株当たり1~2g)	植付時**		植溝散布	5回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内)

** : 但し、登録番号 21789 号 家庭園芸用 G F オ尔特ラン粒剤の「ばれいしょ」の使用時期は「植付前」です。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3～6g/m ² (1株当たり1～2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)
	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期		散布	
はくさい	アオムシ、コガネヨトウムシ アブラムシ類	3～6g/m ² (1株当たり1～2g)	定植時		植穴処理	1回
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ				植溝散布又は植穴処理	
きゅうり なす	アブラムシ類 アサミヤマ類 オンシツコナジラミ				株元散布	
ピーマン	アブラムシ類	1株当たり2g			植溝散布	
ブロッコリー	ヨトウムシ	6g/m ² (1株当たり2g)			株元散布	
だいこん	アオムシ、コガネアブラムシ類	3～4g/m ²			は種前	
かぶ	アブラムシ類	4g/m ²	収穫21日前まで		株元散布	
ばれいしょ		3～6g/m ² (1株当たり1～2g)	植付時		植溝散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)

5) アセフェート・クロチアニジン粒剤 (第 21733 号 オルトラン DX 粒剤)

【変更前】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
トマト	アブラムシ類	1g/株	定植時	1回	植穴処理 土壌混和	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
なす		2g/株					
きゅうり	コナジラミ類						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
トマト	アブラムシ類	1g/株	定植時	1回	植穴処理 土壌混和	1回	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)
なす		2g/株					
きゅうり	コナジラミ類						

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は1日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。

平成26年10月17日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20939号	ジェイエース粒剤	アセフェート粒剤	全国農業協同組合連合会
第21904号	スミフェート粒剤	アセフェート粒剤	住友化学株式会社
第20967号	ジェイエース水溶剤	アセフェート水溶剤	全国農業協同組合連合会
第21903号	スミフェート水溶剤	アセフェート水溶剤	住友化学株式会社

■変更内容及び変更理由

1) アセフェート粒剤（第20939号 ジェイエース粒剤、第21904号 スミフェート粒剤）

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- (ア)作物名「キャベツ」の「適用病害虫名」、「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「ハイマダラノメイガ」を削除し、「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期葉面散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- (イ)作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- (ウ)作物名「ブロッコリー」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫14日前まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「株元散布」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- (エ)作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」に、及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。
- (オ)作物名「かぶ」の「使用時期」及び「使用方法」をそれぞれ「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に、及び「生育期葉面散布」から「株元散布」に変更する。
- (カ)作物名「なばな」の「使用方法」を「定植時土壌混和处理」から「土壌混和处理」に変更する。
- (キ)作物名「きゅうり、トマト、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫前日まで」から「定植時」に、「3回以内」から「1回」に、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。

(ク)作物名「ミニトマト」を削除する。

(ケ)作物名「みずな」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に、及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。

(コ)作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

(サ)作物名「こまつな」の「使用方法」を「は種前作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。

(シ)作物名「チンゲンサイ」の「使用方法」を「定植時作条散布後土壌混和」から「作条散布後土壌混和」に変更する。

2) アセフェート水溶剤

(第 20967 号 シェイエース水溶剤、第 21903 号 スミフェート水溶剤)

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

① 作物名「かんきつ」を削除する。

② 作物名「かき」の「希釈倍数」を「1000～1500倍」から「1500倍」に変更する。

③ 作物名「ぶどう」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫30日前まで」から「収穫60日前まで」に、「2回以内」から「1回」に、及び「2回以内」から「1回」に変更する。

④ 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」に、「3回以内」から「1回」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。

⑤ 作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000～1500倍」から「1500倍」に、「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に、「3回以内」から「1回」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。

⑥ 作物名「レタス」の「使用時期」を「収穫14日前まで」から「収穫30日前まで」に変更する。

⑦ 作物名「ブロッコリー」を削除する。

⑧ 作物名「だいこん」を削除する。

⑨ 作物名「かぶ」を削除する。

⑩ 作物名「チンゲンサイ」の「希釈倍数」を「1000倍」から「1500倍」に変更する。

⑪ 作物名「みずな」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000倍」から「1500倍」に、「収穫14日前まで」から「収穫21日前まで」に、「2回以内」から「1回」及び「2回以内（定植時は1回以内）」から「1回」に変更する。

⑫ 作物名「トマト」、「ミニトマト」及び「なす」を削除する。

⑬ 作物名「オクラ」の「使用時期」を「収穫3日前まで」から「収穫開始7日前まで」に変更する。

- ⑭ 作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫7日前まで」から「収穫30日前まで」に、「4回以内」から「2回以内」に、及び「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- ⑮ 作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採30日前まで」から「摘採45日前まで」に、「2回以内」から「1回」に、及び「2回以内」から「1回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第 20939 号 ジェイエース粒剤、第 21904 号 スミフェート粒剤）

【変更前】

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アセフェートを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 但し、 収穫 21 日前まで	3 回 以内	定植時植穴処理 及び 生育期葉面散布	3 回以内
	ハイマダラノメイガ		収穫 21 日前まで		生育期葉面散布	
はくさい	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類		定植時及び生育期 但し、 収穫 21 日前まで			
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (1株当たり 2g)	定植時及び生育期 但し、 収穫 14 日前まで			
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1 回	は種前作条散布	2 回以内 (は種前及び は種時の 処理は 合計 1 回以内)
かぶ		4kg/10a	収穫 14 日前まで		生育期葉面散布	1 回
なばな	アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり 2g)	定植時		定植時土壌混和 処理	
きゅうり	オンシツコナジラミ アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3 回 以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
トマト						
ミニトマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ			定植時	1 回	定植時作条散布 又は 植穴散布
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類		定植時及び生育期 但し、収穫前日まで	3 回 以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3 回以内
みずな		6kg/10a	定植時	1回	定植時作条散布 後土壌混和	2回以内 (定植時は 1回以内)
ばれいしよ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時		作条散布	5回以内 (植付時の処理 は1回以内、 植付後は 4回以内)
こまつな			は種前		は種前作条 散布後土壌混和	1回
チンゲンサイ			定植時		定植時作条 散布後土壌混和	

[変更後]

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	アセフェートを含 む農薬の 総使用回数	
キャベツ	アオムシ コガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当り 1～2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 1回以内)	
はくさい							
ブロッコリー	ヨトウムシ	6kg/10a (1株当り 2g)			株元散布		
だいこん	アオムシ コガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		作条散布		
かぶ	アブラムシ類	4kg/10a	収穫 21 日 前まで		株元散布		
なばな		6kg/10a (1株当り 2g)			土壌混和処理	1回	
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 アザミウマ類	3～6kg/10a (1株当り 1～2g)	定植時		1回	作条散布 又は 植穴処理	
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ						
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ アザミウマ類						
みずな							
ばれいしょ	アブラムシ類	3～6kg/10a	植付時		作条散布	3回以内 (植付時の処理は 1回以内、 植付後は 2回以内)	
こまつな			は種前		作条散布後 土壌混和	1回	
チンゲンサイ			定植時				

2) アセフェート水溶剤

(第 20967 号 ジェイエース水溶剤、第 21903 号 スミフェート水溶剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ヤノネカイラムシ ツノウムシ ルビローウムシ ミカンキイロアザミウマ アザミウマ類	1000 倍	200~700 L/10a	収穫 30 日前 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	コアオハナムグリ チャノキイロアザミウマ アブラムシ類 ケキスイ類	1000~ 1500 倍					
	ミントゲコジラミ	1500 倍					
かき	カキタアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノハナムシガ	1000~ 1500 倍	100~300 L/10a	収穫 45 日前 まで	2 回 以内		2 回以内
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ	1500~ 2000 倍		収穫 30 日前 まで			
キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 タナギンウハ	1000~ 1500 倍	100~300 L/10a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内		3 回以内
	はくさい			ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類			
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内		2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)
ブロッコリー	ヨトウムシ						
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1500~ 2000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)	
	かぶ	アオムシ コナガ アブラムシ類					1500~ 2000 倍
チンゲンサイ	アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回 以内	2 回以内 (定植時は 1 回以内)	
みずな							
トマト		1000~ 2000 倍		収穫前日 まで	3 回 以内	3 回以内	
	マメハモグリハエ オオタバコガ	1000 倍					

(つづき)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
ミニトマト	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	1回	散布	2回以内 (定植時の処理は1回以内、定植後は1回以内)	
	マメハモグサ、リハエ、オオタバコガ	1000倍						
なす	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内	
	ミカンキイロアザミウマ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類	1000倍						
オクラ	アブラムシ類、フタテンミドリヒメヨコバイ			1000倍	収穫3日前まで			1回
ばれいしょ	ヨトウムシ、オオニシユウヤホシテントウ	1000～2000倍			収穫7日前まで			4回以内
	アブラムシ類		300倍	25L/10a				
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ	1000～2000倍	200～400 L/10a	摘採30日前まで	2回以内	2回以内		
	チャノコカクモンハマキ	1000～1500倍						

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフトを含む農薬の総使用回数
かき	カキタ ^{アサミウマ} チャノキイロアサ ^{ミウマ} カキノハタムシ ^カ	1500 倍	200～700 L/10a	収穫 45 日前 まで	2 回 以内	散布	2 回以内
ぶどう	チャノキイロアサ ^{ミウマ} フタテンヒメヨコ ^{バイ}	1500～ 2000 倍		収穫 60 日前 まで			1 回
キャベツ	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ^カ ヨトウムシ アブラムシ類 タナギンウワバ ^カ	1000～ 1500 倍	100～300 L/10a	収穫 30 日前 まで	1 回		2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 1 回以内)
はくさい	ハスモンヨトウ アオムシ コナガ ^カ ヨトウムシ アブラムシ類	1500 倍					1 回
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコ ^カ	1000～ 1500 倍 1000 倍		3 回 以内	3 回以内		
チンゲンサイ みずな	アブラムシ類	1500 倍		収穫 21 日前 まで	1 回		1 回
オクラ	アブラムシ類 フタテンミト ^{リヒメヨコ} バイ	1000 倍	25L/10a	収穫開始 7 日 前まで	2 回 以内		3回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)
ばれいしょ	ヨトウムシ オオシ ^{ユウヤホシテント} ウ アブラムシ類			1000～ 2000 倍 300 倍	収穫 30 日前 まで		
茶	チャノキイロアサ ^{ミウマ} チャノミト ^{リヒメヨコ} バイ チャノコカクモンハマキ	1000～ 2000 倍 1000～ 1500 倍	200～400 L/10a	摘採 45 日前 まで	1 回	1 回	

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は 1 日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。

平成26年10月17日

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、平成26年11月17日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名
第20940号	「興農」ジェネレート粒剤	アセフェート粒剤	興農股份有限公司
第20968号	「興農」ジェネレート水溶剤	アセフェート水溶剤	興農股份有限公司

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第20940号 「興農」ジェネレート粒剤）

- (ス)作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期（収穫21日前まで）」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期葉面散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「2回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内）」に変更する。
- (セ)作物名「はくさい」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期 但し、収穫21日前まで」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時植穴処理及び生育期株元散布」から「植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- (ソ)作物名「だいこん」の「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「は種前作条散布」から「作条散布」に、及び「2回以内（は種前及びは種時の処理は合計1回以内）」から「1回」に変更する。
- (タ)作物名「きゅうり、トマト、なす」の「使用時期」、「本剤の使用回数」、「使用方法」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「定植時及び生育期（収穫前日まで）」から「定植時に、「3回以内」から「1回」に、「定植時作条散布又は植穴散布、生育期株元散布」から「作条散布又は植穴処理」に、及び「3回以内」から「1回」に変更する。
- (チ)作物名「ミニトマト」を削除する。
- (ツ)作物名「ばれいしょ」の「アセフェートを含む農薬の総使用回数」を「5回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は4回以内）」から「3回以内（植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。

2) アセフェート水溶剤 (第 20968 号 「興農」 ジェネレート水溶剤)

- ① 作物名「かんきつ」を削除する。
- ② 作物名「キャベツ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「3 回以内」から「1 回」に、及び「3 回以内」から「2 回以内 (定植時までの処理は 1 回以内、定植後の散布は 1 回以内)」に変更する。
- ③ 作物名「はくさい」の「希釈倍数」、「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「1000~1500 倍」を「1500 倍」に、「収穫 14 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「3 回以内」から「1 回」に、及び「3 回以内」から「1 回」に変更する。
- ④ 作物名「ブロッコリー」を削除する。
- ⑤ 作物名「だいこん」を削除する。
- ⑥ 作物名「トマト」、「ミニトマト」及び「なす」を削除する。
- ⑦ 作物名「ばれいしょ」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「収穫 7 日前まで」から「収穫 30 日前まで」に、「4 回以内」から「2 回以内」に、及び「5 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 4 回以内)」から「3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)」に変更する。
- ⑧ 作物名「茶」の「使用時期」、「本剤の使用回数」及び「アセフェートを含む農薬の総使用回数」をそれぞれ「摘採 30 日前まで」から「摘採 45 日前まで」に、「2 回以内」から「1 回」に、及び「2 回以内」から「1 回」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかると部分のみ）】

1) アセフェート粒剤（第20940号 「興農」 ジェネレート粒剤）

[変更前]

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 (収穫21日前まで)	3回以内	定植時植穴処理 及び 生育期葉面散布	3回以内
はくさい	アオムシ アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり2g)			定植時植穴処理 及び 生育期株元散布	
	コナガ ヨトウムシ					
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前	1回	は種前作条散布	2回以内 (は種前及び は種時の 処理は 合計1回以内)
きゅうり	オンシツコナジラミ アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時及び生育期 (収穫前日まで)	3回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3回以内
トマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり2g)				
ミニトマト	オンシツコナジラミ	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時	1回	定植時作条散布 又は 植穴散布	2回以内 (定植時の処理 は1回以内、 定植後は 1回以内)
なす	アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり2g)	定植時及び生育期 (収穫前日まで)	3回以内	定植時作条散布 又は植穴散布、 生育期株元散布	3回以内
ばれいしょ		3～6kg/10a	植付時	1回	作条散布	5回以内 (植付時の処理 は1回以内、植付 後は4回以内)

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時	1回	植穴処理	2回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 1回以内)
はくさい	アオムシ アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり 2g)				は種前
	コナガ ヨトウムシ					
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4kg/10a	は種前		作条散布	
きゅうり	オンシツコナジラミ アザミウマ類 アブラムシ類	3～6kg/10a (1株当たり 1～2g)	定植時		作条散布 又は 植穴処理	
トマト	オンシツコナジラミ	6kg/10a (1株当たり 2g)				
	アブラムシ類					
なす	アブラムシ類	6kg/10a (1株当たり 2g)	定植時	作条散布 又は 植穴処理		
ばれいしょ		3～6kg/10a	植付時	作条散布	3回以内 (植付時の処理は 1回以内、植付後は 2回以内)	

2) アセフェート水溶剤 (第 20968 号 「興農」 ジェネレート水溶剤)

[変更前]

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
かんきつ	ヤノ初カラムシ ツノロムシ ルビノロムシ コアオナムガ ミカンキイロアザミウマ	1000 倍	収穫 30 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内	
	チャノキイロアザミウマ アブラムシ類	1000~1500 倍					
キャベツ	アオムシ コナガ	1500 倍	収穫 7 日前 まで	2 回以内			2 回以内 (は種前及び は種時の処理は 合計 1 回以内)
はくさい			ヨトウムシ アブラムシ類				
だいこん	1000 倍	収穫 14 日前 まで		3 回以内			3 回以内
ブロッコリー	1000 倍						
トマト	アブラムシ類	1000~2000 倍	収穫前日 まで	3 回以内			2 回以内 (定植時の処理 は 1 回以内、定 植後は 1 回以内)
	マハエグリハエ	1000 倍					
ミニトマト	アブラムシ類	1000~2000 倍	収穫前日 まで	1 回			2 回以内 (定植時の処理 は 1 回以内、定 植後は 1 回以内)
	マハエグリハエ	1000 倍					
なす	アブラムシ類	1000~2000 倍	収穫 7 日前 まで	3 回以内	3 回以内		
	ミカンキイロアザミウマ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000 倍					
ばれいしょ	アブラムシ類 オオニジュウヤホシテントウ	1000 倍	収穫 7 日前 まで	4 回以内	5 回以内 (植付時の処理 は 1 回以内、植 付後は 4 回以内)		
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000~2000 倍	摘採 30 日前 まで	2 回以内	2 回以内		
	チャノコクモンハマキ	1000~1500 倍					

[変更後]

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	アゼートを含 む農薬の 総使用回数
キャベツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	1000～ 1500 倍	100～300 L/10a	収穫 30 日前 まで	1 回	散布	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 1 回以内)
はくさい		1500 倍					1 回
ばれいしょ	アブラムシ類 オオニジュウヤホシテントウ	1000 倍	2 回 以内	3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内、植付後は 2 回以内)			
茶	チャノキイロアサミマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000～ 2000 倍	200～400 L/10a	摘採 45 日前 まで	1 回		1 回
	チャノコクモンハマキ	1000 ～ 1500 倍					

【変更理由】

新たに導入された短期暴露評価に対応して製造者が自ら短期的な摂取量を試算した結果、本剤の使用により想定される最高濃度で残留した農作物を一度又は 1 日に多く摂取した場合に、想定される急性参照用量を超過することが予想されたため。